



カユミン軟膏M

鎮痒消炎薬

特 徴

クミアイカユミン軟膏Mは、さわやかな清涼感とともにかゆみをやわらげる軟膏です。かゆみをすばやく止めますから、虫さされ、かぶれ、湿疹などのかゆみを伴う様々な皮膚疾患に効果的です。



使用上の注意

相談すること



1. 次の人は使用前に医師又は薬剤師に相談してください。

- (1) 医師の治療を受けている人
- (2) 本人又は家族がアレルギー体質の人
- (3) 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人
- (4) 湿潤やただれのひどい人

2. 次の場合は、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師又は薬剤師に相談してください。

(1) 使用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ、はれ

(2) 5～6日間使用しても症状がよくなる場合

効能・効果

かゆみ、虫さされ、かぶれ、ただれ、じんましん、湿疹、あせも、皮膚炎

用法・用量

用にのぞみ、適量を患部に塗布又はすり込んでください。

用法・用量に関連する注意

- (1) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (2) 目に入らないよう注意してください。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗ってください。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けてください。
- (3) 外用にのみ使用してください。

成分・分量

100g中

成 分	含 量	は た ら き
ジフェンヒドラミン	1.0g	皮膚病や虫さされなどに伴う、かゆみや炎症を緩和します。
酢酸トコフェロール	0.5g	末梢の血流を良くして炎症をしずめ、湿疹・ただれなどに効果があります。
dℓ-カンフル	6.0g	患部を刺激して血行を促進します。
ℓ-メントール	4.0g	清涼性があり、痛みやかゆみを抑えます。

添加物として、ステアリン酸、ワセリン、流動パラフィン、プロピレングリコール、グリセリン脂肪酸エステル、ポリソルベート60、オレイン酸ソルビタン、パラベン、サリチル酸メチルを含有する。

保管及び取り扱い上の注意

- (1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2)小児の手の届かない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり、品質が変わります。)
- (4)使用期限(外箱に記載)を過ぎた製品は使用しないでください。

こんな時にカユミン軟膏M かゆみ
虫さされ

蚊やアブ、ブヨなどに刺されたら、患部をかかないでできるだけ早く、少し広めにカユミン軟膏Mをすり込んでください。

かぶれ

ウルシ、ツタ、ギンナンなど…かぶれの原因を確かめ、軽いかぶれなら患部を清潔にして、カユミン軟膏Mを塗布してください。

じんましん

著しいかゆみも一時的なものが多くあります。カユミン軟膏Mでかゆみをしずめて、治りを早めてあげましょう。

あせも

患部を清潔にして、汗を良く拭いてカユミン軟膏Mを塗布してください。しみませんから、小さなお子様にも安心して使えます。

お問い合わせ先

クミアイ家庭薬相談窓口

電話：0238-46-2013

[月～金曜日 9:00～17:00(祝日を除く)]

販 売 者 **全国農業協同組合連合会**
東京都千代田区大手町一丁目8番3号

製造販売者 **協同薬品工業株式会社**
山形県東置賜郡川西町大字西大塚930