



新せき止錠「エス」

鎮咳去痰薬

特 徴

- すぐれた鎮咳薬であるリン酸ジヒドロコデインがせきの中枢に直接作用して、せきをすみやかにしずめます。
- 溶けやすい素錠で、効き目が早くあらわれます。



使用上の注意

してはいけないこと



(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなります)

1. 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も服用しないでください。
他の鎮咳去痰薬、かぜ薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬（鼻炎用内服薬、乗物酔い薬、アレルギー用薬）、鎮静薬
2. 服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないでください。
(眠気があらわれることがあります。)

相談すること



1. 次の人は服用前に医師又は薬剤師に相談してください。
 - (1)医師の治療を受けている人
 - (2)妊婦又は妊娠していると思われる人
 - (3)授乳中の人
 - (4)高齢者
 - (5)本人又は家族がアレルギー体質の人
 - (6)薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人
 - (7)次の症状のある人：高熱、排尿困難
 - (8)次の診断を受けた人：心臓病、高血圧、糖尿病、甲状腺機能障害、緑内障
2. 次の場合は、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師又は薬剤師に相談してください。
 - (1)服用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消 化 器	悪心・嘔吐、食欲不振
精神神経系	めまい
そ の 他	排尿困難

 - (2)5～6回服用しても症状がよくなる場合
3. 次の症状があらわれることがあるので、このような症状の継続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、医師又は薬剤師に相談してください。
便秘、口のかわき

効能・効果

せき、たん



用法・用量

次の量を、食後に服用してください。

年 齢	1 回量	1 日の服用回数
15歳以上	4 錠	3 回
8 歳～14歳	2 錠	
5 歳～7 歳	1 錠	
5 歳未満	服用しないこと	

用法・用量に関連する注意

(1)小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。

(2)錠剤の取り出し方

図のように錠剤の入っているPTPシートの凸部を指先で強く押して、裏面のアルミ箔を破り、取り出して服用してください。（誤ってそのまま飲み込んだりすると食道粘膜に突き刺さる等思わぬ事故につながります。）



成分・分量

1 日量（12錠）中

成 分	含量	は た ら き
リン酸ジヒドロコデイン	30mg	せきの中枢に直接作用して、せきをすみやかにしずめます。
dL-塩酸メチル エフェドリン	75mg	気管支の緊張をやわらげてせきをしずめ、たんを切ります。
マレイン酸クロル フェニラミン	12mg	アレルギー症状を起こすヒスタミンの働きを抑え、せきをしずめます。
無 水 カ フ ェ イ ン	150mg	抗ヒスタミン薬による眠気を防ぎます。

添加物として、炭酸Mg、乳糖、セルロース、無水ケイ酸、ヒドロキシプロピルスターチ、カルメロースCa、ヒドロキシプロピルセルロース、ステアリン酸Mgを含有する。

保管及び取扱い上の注意

- (1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2)小児の手の届かない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れ替えないでください。（誤用の原因になったり、品質が変わります。）
- (4)使用期限（外箱に記載）を過ぎた製品は服用しないでください。

養生訓

せきは、生体の防御反応の一つですが、かぜの第一の感染源にもなります。更に、激しいせきは体力を消耗したり、のどを痛めたり、安静や睡眠を妨げる原因になることも多いものです。

せき・たんを早く治すには…



無理をせず、栄養・睡眠を十分にとりましょう。



タバコはひかえましょう。



室内の空気の乾燥やホコリなどに気をつけましょう。

お問い合わせ先

クミアイ家庭薬相談窓口

電話：0238-46-2013

〔月～金曜日 9：00～17：00（祝日を除く）〕

販 売 者 **全国農業協同組合連合会**
東京都千代田区大手町一丁目8番3号

製造販売者 **協同薬品工業株式会社**
山形県東置賜郡川西町大字西大塚930