



第②類医薬品

新せき止錠「エス」

鎮咳去痰薬

特 徴

- すぐれた鎮咳薬であるジヒドロコデインリン酸塩がせきの中枢に直接作用して、せきを速やかにしずめます。
- 気管支拡張薬dℓ-メチルエフェドリン塩酸塩がせきをしずめ、たんを出しやすくします。
- 溶けやすい小さな錠剤で、効き目が早くあらわれます。



使用上の注意

してはいけないこと



(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなります。)

1. 次の人は服用しないでください。

12歳未満の小児

2. 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も使用しないでください。

他の鎮咳去痰薬、かぜ薬、鎮静薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬等（鼻炎用内服薬、乗物酔い薬、アレルギー用薬等）

3. 服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないでください。

(眠気等があらわれることがあります。)

4. 授乳中の人は本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳を避けてください。

5. 過量服用・長期連用しないでください。

相談すること



1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

- (1) 医師の治療を受けている人
- (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人
- (3) 高齢者
- (4) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人
- (5) 次の症状のある人：高熱、排尿困難
- (6) 次の診断を受けた人：心臓病、高血圧、糖尿病、緑内障、甲状腺機能障害、呼吸機能障害、閉塞性睡眠時無呼吸症候群、肥満症

2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消 化 器	吐き気・嘔吐、食欲不振
精神神経系	めまい
泌 尿 器	排尿困難

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症 状
再生不良性貧血	青あざ、鼻血、歯ぐきの出血、発熱、皮膚や粘膜が青白くみえる、疲労感、動悸、息切れ、気分が悪くなりくらっとする、血尿等があらわれる。
無顆粒球症	突然の高熱、さむけ、のどの痛み等があらわれる。
呼吸抑制	息切れ、息苦しさ等があらわれる。

3. 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

便秘、口のかわき、眠気

4.5～6回服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

効能・効果

せき、たん

用法・用量

次の量を、食後に服用してください。

年 齢	1回量	服用回数
15歳以上	4錠    	1日3回
12歳～14歳	2錠  	
12歳未満	服用しないこと	

〈用法・用量に関連する注意〉

- 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。
- 錠剤の取り出し方
図のように錠剤の入っているPTPシートの凸部を指先で強く押して、裏面のアルミ箔を破り、取り出して服用してください。（誤ってそのまま飲み込んだりすると食道粘膜に突き刺さる等思わぬ事故につながります。）



成分・分量 1日量(12錠)中

成 分	含 量	は た ら き
ジヒドロコデインリン酸塩	30mg	せきの中枢に直接作用して、せきを速やかにしずめます。
dℓ-メチルエフェドリン塩酸塩	75mg	気管支の緊張をやわらげて、せきをしずめ、たんを切ります。
クロルフェニラミンマレイン酸塩	12mg	アレルギー症状を起こすヒスタミンの働きを抑え、せきをしずめます。
無水カフェイン	150mg	抗ヒスタミン薬による眠気を防ぎます。

添加物として、炭酸Mg、乳糖、セルロース、無水ケイ酸、ヒドロキシプロピルスターチ、カルメロースCa、ヒドロキシプロピルセルロース、ステアリン酸Mgを含有する。

保管及び取扱い上の注意

- 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- 小児の手の届かない所に保管してください。
- 他の容器に入れ替えないでください。（誤用の原因になったり、品質が変わります。）
- 使用期限（外箱に記載）を過ぎた製品は服用しないでください。

お問い合わせ先

お客様相談窓口 ☎ 0238 (46) 2013
月～金曜日 9:00～17:00(祝日を除く)

製造販売者 **協同薬品工業株式会社**
山形県東置賜郡川西町大字西大塚930