



クミアイ

新総合感冒錠「エス」

総合感冒薬

第②類医薬品

特 徴

- クミアイ新総合感冒錠「エス」は、多種多様なかぜの諸症状に効果を発揮するよう、各種の有効成分を配合した総合感冒薬です。
- かぜは昔から“万病のもと”といわれ、こじらせるといろいろな病気を引き起こしますから、ひきはじめのうちにできるだけ早く治療することが大切です。
- 早めにクミアイ新総合感冒錠「エス」を服用し、養生することがかぜを治すポイントです。
- 服用しやすい錠剤で、5歳の小児から服用できますから、ご家庭の常備薬としても最適です。



使用上の注意

してはいけないこと



(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなります)

1. 次の人は服用しないでください。
 - (1)本剤によるアレルギー症状を起こしたことがある人
 - (2)本剤又は他のかぜ薬、解熱鎮痛薬を服用してぜんそくを起こしたことがある人
2. 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も服用しないでください。
他のかぜ薬、解熱鎮痛薬、鎮静薬、鎮咳去痰薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬（鼻炎用内服薬、乗物酔い薬、アレルギー用薬）
3. 服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないでください。
(眠気があらわれることがあります。)
4. 服用時は飲酒しないでください。
5. 長期連用しないでください。

相談すること



1. 次の人は服用前に医師又は薬剤師に相談してください。
 - (1)医師又は歯科医師の治療を受けている人
 - (2)妊婦又は妊娠していると思われる人
 - (3)授乳中の人
 - (4)高齢者
 - (5)本人又は家族がアレルギー体質の人
 - (6)薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人
 - (7)次の症状のある人：高熱、排尿困難
 - (8)次の診断を受けた人：甲状腺機能障害、糖尿病、心臓病、高血圧、肝臓病、腎臓病、胃・十二指腸潰瘍、緑内障
2. 次の場合は、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師又は薬剤師に相談してください。
 - (1)服用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消 化 器	悪心・嘔吐、食欲不振
精神神経系	めまい
そ の 他	排尿困難

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症 状
ショック (アナフィラキシー)	服用後すぐにじんましん、浮腫、胸苦しさ等とともに、顔色が青白くなり、手足が冷たくなり、冷や汗、息苦しさ等があらわれる。
皮膚粘膜眼症候群 (スティーブス・ジョンソン症候群) 中毒性表皮壊死症 (ライエル症候群)	高熱を伴って、発疹・発赤、火傷様の水ぶくれ等の激しい症状が、全身の皮ふ、口や目の粘膜にあらわれる。
肝機能障害	全身のだるさ、黄疸（皮ふや白目が黄色くなる）等があらわれる。
間質性肺炎	空せき（たんを伴わないせき）を伴い、息切れ、呼吸困難、発熱等があらわれる。（これらの症状は、かぜの諸症状と区別が難しいこともあり、空せき、発熱等の症状が悪化した場合にも、服用を中止するとともに、医師の診療を受けること。）
ぜんそく	

(2)5～6回服用しても症状がよくなる場合

3. 次の症状があらわれることがあるので、このような症状の継続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、医師又は薬剤師に相談してください。

便秘、口のかわき

効能・効果

かぜの諸症状（鼻水、鼻づまり、くしゃみ、のどの痛み、せき、たん、悪寒、発熱、頭痛、関節の痛み、筋肉の痛み）の緩和

用法・用量

次の量を、食後なるべく30分以内に服用してください。

年 齢	1 回 量	1 日の服用回数
15歳以上	4 錠	3 回
7 歳～14歳	2 錠	
5 歳～6 歳	1 錠	
5 歳未満	服用しないこと	

用法・用量に関連する注意

(1)小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。

(2)錠剤の取り出し方

図のように錠剤の入っているPTPシートの凸部を指先で強く押して、裏面のアルミ箔を破り、取り出して服用してください。（誤ってそのまま飲み込んだりすると食道粘膜に突き刺さる等思わぬ事故につながります。）



成分・分量

1 日 量（12 錠）中

成 分	含 量	は た ら き
アセトアミノフェン	900 mg	熱を下げ、痛みをやわらげます。
d-クロルフェニラミン マレイン酸塩	3.5 mg	くしゃみ・鼻水・鼻づまりなどのアレルギー症状をおさえます。
ジヒドロコデインリン酸塩	16 mg	せきを止めます。
dℓ-メチルエフェドリン塩酸塩	60 mg	気管支の緊張をやわらげてせきをしずめ、たんを切ります。
無水カフェイン	75 mg	頭痛をやわらげます。

添加物として、乳糖、セルロース、部分アルファ化デンプン、無水ケイ酸、クロスカルメロースNa、ヒドロキシプロピルセルロース、ステアリン酸Mgを含有する。

保管及び取扱い上の注意

- (1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2)小児の手の届かない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れ替えないでください。（誤用の原因になったり、品質が変わります。）
- (4)使用期限（外箱に記載）を過ぎた製品は服用しないでください。

お問い合わせ先

クミアイ家庭薬相談窓口

電話：0238-46-2013

[月～金曜日 9：00～17：00（祝日を除く）]

販 売 者 **全国農業協同組合連合会**

製造販売者 **協同薬品工業株式会社**
山形県東置賜郡川西町大字西大塚930