

第2類医薬品



クミアイ

ネオエキス錠_s

下痢止め薬

特 徴

- 生薬のオウバク（黄柏）より得られるオウバクエキスを、沈降炭酸カルシウムを配合した下痢止めの薬です。
- 2つの成分が相乗的に働いて、日常起こりがちな下痢・食あたり・水あたり・軟便などに効果をあらわします。
- 5歳のお子様から服用できます。



使用上の注意

相談すること



1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
 - (1) 医師の治療を受けている人
 - (2) 発熱を伴う下痢のある人、血便のある人又は粘液便の続く人
 - (3) 高齢者
 - (4) 次の診断を受けた人：甲状腺機能障害
2. 5～6日間服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

効能・効果

下痢、消化不良による下痢、食あたり、はき下し、水あたり、くだり腹、軟便

用法・用量

次の量を服用してください。服用間隔は4時間以上おいてください。

年 齢	1 回 量	服用回数
15歳以上	4 ～ 6 錠	1日3回
11歳～14歳	3 ～ 4 錠	
8歳～10歳	2 ～ 3 錠	
5歳～7歳	2 錠	
5歳未満	服用しないこと	



〈用法・用量に関連する注意〉

小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。

成分・分量 1日量(18錠)中

成 分	含 量	はたらき
オウバクエキス (日局オウバク4,587mgに相当)	1,390mg	主成分のベルベリンには、腸内の殺菌、腸運動の調整、腐敗の抑制などの作用がある他、その強い苦みが弱った胃腸の動きを促して回復を早めます。
沈降炭酸カルシウム	2,544mg	胃内の余分な酸を中和する制酸作用の他、有害菌によってつくり出される毒素や腐敗発酵物を吸着する作用があります。

添加物として、ケイ酸Al、パレイショデンブ、カルメロースCa、ステアリン酸Mgを含有する。

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり、品質が変わります。)
- (4) 服用のつどキャップをよくしめてください。
- (5) ビンの中の詰め物は、キャップをあけた後は捨ててください。(詰め物は、輸送中の錠剤の破損を防ぐためのものです。)
- (6) 使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。

お問い合わせ先

クミアイ家庭薬相談窓口 ☎ 0238(46) 2013
月～金曜日 9:00～17:00 (祝日を除く)

販 売 者 **全国農業協同組合連合会**
東京都千代田区大手町1-3-1

製造販売者 **協同薬品工業株式会社**
山形県東置賜郡川西町大字西大塚930