

ご使用に際して、この説明文書を必ずお読みください。
また、必要な時に読めるように大切に保管してください。

下痢・食あたり・水あたり
止しゃ薬（下痢止め）

マツ®
ワカ末錠

⚠ 使用上の注意



相談すること

1. 次の人は服用前に医師又は薬剤師に相談してください
(1) 医師の治療を受けている人
(2) 発熱を伴う下痢、血便、粘液便のある人
(3) 高齢者
2. 次の場合は、服用を中止し、この文書を持って医師又は薬剤師に相談してください
5～6日間服用しても症状がよくならない場合

効 能

下痢、消化不良による下痢、食あたり、
はき下し、水あたり、くだり腹、軟便

用法・用量

次の量を1日3回食後に服用。



下痢



はき下し

年 齢	1回量	1日服用回数
成人（15才以上）	4錠	3回
8才以上15才未満	2錠	
8才未満	服用しないこと	

〈用法・用量に関連する注意〉

小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。

成 分

成人1日の服用量12錠（1錠240mg）中、ベルベリン塩化物水和物[Ⓔ]を300mg含有しています。

添加物として、乳糖、トウモロコシデンプン、ゼラチン、タルク、結晶セルロース、ステアリン酸Mgを含有する。

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。
（誤用の原因になったり品質が変わります。）
- (4) ビンの中の詰物は、輸送中に錠剤が破損するのを防ぐためのものです。
開栓後は不要となりますのですててください。
- (5) 使用期限のすぎた商品は服用しないでください。
- (6) 水分が錠剤につきますと、変色または色むらを生じることがありますので、誤って水滴を落としたり、ぬれた手で触れないでください。



ワカ末錠^{マツ®}

Before use, read this instruction sheet.
Keep this sheet carefully for future reference.

For diarrhea, food poisoning and water poisoning
Antidiarrheals
WAKAMATU® TABLETS

Precautions for use

Consult your physician or pharmacist.

1. In either of the following cases, consult your physician or pharmacist before taking the medicine.
 - (1) You are receiving medical treatment by a physician.
 - (2) You have diarrhea with fever, bloody stool or mucous stool.
 - (3) You are of advanced age.
2. If your condition does not improve even after taking the medicine for five or six days, stop taking medication and seek advice from your physician or pharmacist, taking this sheet with you.

Indications

Diarrhea, diarrhea due to indigestion, food poisoning, vomiting and purging, water poisoning, loose bowels, soft stool.

Dosage and administration

Take the following dose three times per day after meals.

Age	Dose	Times of medication per day
Adults(over 15 years old)	4 tab.	3 times
Children aged 8 to 15 years old	2 tab.	3 times
Children under 8 years old	Should not take this medicine.	

Notes on dosage and administration

Children should take the medicine under the guidance and supervision of a guardian.

Composition

12 tablets (240mg per tablet) to be taken per day contain 300mg of Berberine Chloride Hydrate. The additives Lactose, Corn Starch, Gelatin, Talc, Microcrystalline Cellulose and Magnesium Stearate are contained.

Precautions for storage and handling

- (1) Store it in a cool, dry place away from direct sunlight. (In the case of bottle packing, cap the bottle firmly. The packing in the bottle is to prevent possible damage to tablets during transportation. Discard it after opening the bottle.)
- (2) Keep out of the reach of children.
- (3) Do not repack the medicine into another container. (It may cause misuse or deterioration of quality.)
- (4) Do not take the product after the expiry date for consumption.
- (5) In case the tablets absorb moisture of the air it would possibly cause them some discoloration or mottles. So make it in mind to keep the tablets out of any drop of water and not touch them with wet hand directly.

Distributed by	Kracie Pharmaceutical, Ltd. 20-20, Kaigan 3-chome, Minato-ku, Tokyo 108-8080, Japan.
Manufactured and Distributed by	Kracie Pharma, Ltd. 20-20, Kaigan 3-chome, Minato-ku, Tokyo 108-8080, Japan.

本剤について、何かお気づきの点がございましたら、お買い求めのお店
又は下記までご連絡いただきますようお願い申し上げます。

クラシエ薬品株式会社 お客様相談窓口 ☎ (03) 5446-3334
受付時間 10:00~17:00 (土、日、祝日を除く)

ホームページ www.kracie.co.jp

発売元

クラシエ薬品株式会社
東京都港区海岸3-20-20 (〒108-8080)

製造販売元

クラシエ製薬株式会社
東京都港区海岸3-20-20 (〒108-8080)