

Kracie

ご使用に際して、この説明文書を必ずお読みください。
また、必要な時に読めるように大切に保管してください。

第3類医薬品

生薬製剤

ヨクイニンエキス顆粒クラシエ

特 徴

- 「ヨクイニン」は、中国最古の薬物書「シンノウホンゾウキョウ神農本草経」に記載されています。
- 古くからいぼや皮膚のあれにすぐれた効果のある生薬として用いられています。いぼは、ウイルスの感染によって皮膚の角質が増殖しておこり、他の部位にも広がりやすいので注意が必要です。

⚠使用上の注意



相談すること

- 1.次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
(1)医師の治療を受けている人
(2)妊婦又は妊娠していると思われる人
- 2.服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症 状
消 化 器	胃部不快感

- 3.服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
下痢
- 4.1ヵ月位服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

効 能

いぼ、皮膚のあれ



いぼ



皮膚のあれ

用法・用量

次の量を1日3回食前又は食間に水又は白湯にて服用。

年 齢	1回量	1日服用回数
成人（15才以上）	1包	3回
15才未満7才以上	2／3包	
7才未満4才以上	1／2包	
4才未満2才以上	1／3包	
2才未満	服用しないこと	

〈用法・用量に関連する注意〉

小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。

成 分

成人1日の服用量3包（1包1.5g）中、次の成分を含んでいます。

ヨクイニンエキス 1,500mg

〔ヨクイニン19.5gより抽出。〕

添加物として、ヒドロキシプロピルセルロース、乳糖を含有する。

〈成分に関連する注意〉

本剤は天然物（ヨクイニン）のエキスをを用いていますので、顆粒の色が多少異なることや、ヨクイニン特有のにおいを感じる場合があります。

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。
(誤用の原因になったり品質が変わります。)
- (4) 使用期限のすぎた商品は服用しないでください。
- (5) 1包を分割した残りを服用する時は、袋の口を折り返して保管し、2日をすぎた場合には服用しないでください。



健康アドバイス

●便秘に 気をつけて




便秘はお肌にとって大敵です。バランスのとれた食事を心がけ、特に温野菜や豆類、根菜類など食物繊維を多く含んだ食品をとりましょう。

●規則正しい生活を



睡眠不足や疲労、ストレス、偏った食事などは、皮膚の健康のためによくありません。睡眠を十分にとって、規則正しい生活を心がけましょう。

●プールの後は 清潔に



いぼは、プールなどでうつることが多いといわれています。プールに入った後は手足の指の間までよく洗って、汗や汚れを落としましょう。

副作用被害救済制度の問合せ先
(独)医薬品医療機器総合機構
<http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai.html>
☎ 0120-149-931

本剤について、何かお気づきの点がございましたら、お買い求めのお店又は下記までご連絡いただきますようお願い申し上げます。

クラシエ 薬品株式会社 お客様相談窓口 ☎ (03) 5446-3334
受付時間 10:00~17:00 (土、日、祝日を除く)

ホームページ www.kracie.co.jp

発 売 元

クラシエ 薬品株式会社

東京都港区海岸3-20-20 (〒108-8080)

製造販売元

クラシエ 製薬株式会社

東京都港区海岸3-20-20 (〒108-8080)