

ご使用に際して、この説明文書を必ずお読みください。
また、必要な時に読めるように大切に保管してください。

漢方製剤

十味敗毒湯エキス錠クラシエ

(ジュウミハイドクトウ)

特 徴

- 「十味敗毒湯」は、我が国江戸時代、世界で初めて乳癌の麻酔手術を行った世界的な医学者華岡青洲によって創られた「瘍科方笈」に収載されている薬方です。
- 癬（できもの）や急性で発赤し腫れて痛みのある化膿性の皮膚疾患、湿疹、じんましんなどがゆみや熱をもったり化膿するおそれのある皮膚疾患に使われています。

⚠ 使用上の注意



相談すること

1. 次の人は服用前に医師又は薬剤師に相談してください
 - (1) 医師の治療を受けている人
 - (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人
 - (3) 体の虚弱な人（体力の衰えている人、体の弱い人）
 - (4) 胃腸の弱い人
 - (5) 今までに薬により発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人
2. 次の場合は、服用を中止し、この文書を持って医師又は薬剤師に相談してください

1ヵ月位（化膿性皮膚疾患・急性皮膚疾患の初期、急性湿疹に服用する場合には1週間位）服用しても症状がよくなる場合
3. 本剤の服用により、まれに症状が進行することもありますので、このような場合には、服用を中止し、医師又は薬剤師に相談してください

効 能

化膿性皮膚疾患・急性皮膚疾患の初期、じんましん、急性湿疹、水虫



急性湿疹

用法・用量

次の量を1日3回食前又は食間に水又は白湯にて服用。

年 齢	1回量	1日服用回数
成人（15才以上）	4錠	3回
15才未満7才以上	3錠	
7才未満5才以上	2錠	
5才未満	服用しないこと	

〈用法・用量に関連する注意〉

小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。

成 分

成人1日の服用量12錠(1錠400mg)中、次の成分を含んでいます。
十味敗毒湯エキス2,000mg

サイコ・キキョウ・センキュウ・ブクリョウ・レンギョウ・オウヒ
各1.5g、ボウフウ・ドクカツ各1.0g、カンゾウ・ケイガイ各0.5g、
ショウキョウ0.16gより抽出。


添加物として、乳糖、ステアリン酸Mg、CMC-Ca、セルロース、
メタケイ酸アルミン酸Mg、水酸化Al/Mgを含有する。

〈成分に関連する注意〉

本剤は天然物（生薬）のエキスをを用いていますので、錠剤の色が多少異なることがあります。

保管及び取扱い上の注意

- (1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
(ビン包装の場合は、密栓して保管してください。なお、ビンの
中の詰物は、輸送中に錠剤が破損するのを防ぐためのものです。
開栓後は不要となりますのですててください。)
- (2)小児の手の届かない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れ替えないでください。
(誤用の原因になったり品質が変わります。)
- (4)使用期限のすぎた商品は服用しないで
ください。
- (5)水分が錠剤につきますと、変色または色むらを生じることがあり
ますので、誤って水滴を落としたり、ぬれた手で触れないでくだ
さい。
- (6)4錠分包の場合、1包を分割した残りを服用する時は、袋の口を
折り返して保管してください。なお、2日をすぎた場合には服用
しないでください。



健康アドバイス

●からだを清潔に




からだを清潔に保つためには、毎日入浴することが好ましいですが、かゆみが強い時にはぬるめのお風呂にし、低刺激性のせっけんで軽く洗う程度にしましょう。

●刺激の強いものは避ける



刺激の強い香辛料やアルコール、あくの強い食物など、かゆみを増す食事は避けましょう。食事はバランスよくとりましょう。

●直射日光を避ける



外出する時は直射日光を避け、通気性のよいものを身につけましょう。また、下着や寝巻は皮膚への刺激の少ない絹や綿の柔らかいものが適しています。

本剤について、何かお気づきの点がございましたら、お買い求めのお店
又は下記までご連絡いただきますようお願い申し上げます。

クラシエ薬品株式会社 お客様相談窓口 ☎ (03) 5446-3334
受付時間 10:00~17:00 (土、日、祝日を除く)

ホームページ www.kracie.co.jp

発 売 元

クラシエ薬品株式会社

東京都港区海岸3-20-20 (〒108-8080)

製造販売元

クラシエ製薬株式会社

東京都港区海岸3-20-20 (〒108-8080)