

ご使用に際して、この説明文書を必ずお読みください。  
また、必要な時に読めるように大切に保管してください。

第2類医薬品

漢方製剤

## 参苓白朮散料エキス顆粒「クラシエ」

(ジンレイビャクジュツサン)

## 特 徴

- 「参苓白朮散」は、漢方の古典といわれる中国の医書「フサイキョクホウ和剤局方」に記載されている薬方です。
- やせて顔色が悪く、食欲がなく下痢が続く傾向がある方の食欲不振、慢性下痢、病後の体力低下、疲労倦怠に効果があります。

## ⚠ 使用上の注意



## 相談すること

1. 次の人は服用前に医師又は薬剤師に相談してください  
(1) 医師の治療を受けている人  
(2) 妊婦又は妊娠していると思われる人
2. 次の場合は、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師又は薬剤師に相談してください  
(1) 1ヵ月位服用しても症状がよくなる場合

## 効 能

やせて顔色が悪く、食欲がなく下痢が続く傾向があるものの次の諸症：

食欲不振、慢性下痢、病後の体力低下、疲労倦怠

## 用法・用量

次の量を1日3回食前又は食間に水又は白湯にて服用。

| 年 齢       | 1回量     | 1日服用回数 |
|-----------|---------|--------|
| 成人（15才以上） | 1包      | 3回     |
| 15才未満7才以上 | 2／3包    |        |
| 7才未満4才以上  | 1／2包    |        |
| 4才未満2才以上  | 1／3包    |        |
| 2才未満      | 服用しないこと |        |

## 〈用法・用量に関連する注意〉

小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。

## 成 分

成人1日の服用量3包(1包1.5g)中、次の成分を含んでいます。

参苓白朮散料エキス粉末 .....3,400mg

〔ニンジン・サンヤク各1.5g、ビャクジュツ・ブクリョウ各2.0g、  
ヨクイニン2.5g、ヘンズ・レンニク・キキョウ・シュクシャ  
各1.0g、カンゾウ0.75gより抽出。〕

添加物として、ヒドロキシプロピルセルロース、乳糖、ステアリン酸Mgを含有する。

### 〈成分に関連する注意〉

本剤は天然物（生薬）のエキスをを用いていますので、顆粒の色が多少異なることがあります。

## 保管及び取扱い上の注意

- (1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2)小児の手の届かない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れ替えないでください。  
(誤用の原因になったり品質が変わります。)
- (4)使用期限のすぎた商品は服用しないでください。
- (5)1包を分割した残りを服用する時は、袋の口を折り返して保管し、2日をすぎた場合には服用しないでください。



副作用被害救済制度の問合せ先  
(独)医薬品医療機器総合機構  
<http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai.html>  
☎ 0120-149-931

本剤について、何かお気づきの点がございましたら、お買い求めのお店又は下記までご連絡いただきますようお願い申し上げます。

クラシエ薬品株式会社 お客様相談窓口 ☎ (03) 5446-3334  
受付時間 10:00~17:00 (土、日、祝日を除く)

ホームページ [www.kracie.co.jp](http://www.kracie.co.jp)

発 売 元 **クラシエ薬品株式会社**  
東京都港区海岸3-20-20 (〒108-8080)

製造販売元 **大峰堂薬品工業株式会社**  
奈良県大和高田市根成柿574 (〒635-0051)