

ご使用に際して、この説明文書を必ずお読みください。
また、必要な時に読めるように大切に保管してください。

太りぎみで、むくみが気になる方に
漢方製剤

コッコアポ[®] L錠

特 徴

- 「コッコアポ[®] L錠」は、漢方の古典といわれる中国の医書「金匱要略」^{キン キ ヨウリヤク}に収載されている「防己黄耆湯」^{ボウ イ オウ キ トウ}という薬方です。
- 色白で疲れやすく、汗のかきやすい方の水ぶとり、むくみ、関節痛に効果があります。

⚠使用上の注意



相談すること

1.次の人は服用前に医師又は薬剤師に相談してください

- (1) 医師の治療を受けている人
- (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人
- (3) 高齢者
- (4) 今までに薬により発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人
- (5) 次の症状のある人
むくみ
- (6) 次の診断を受けた人
高血圧、心臓病、腎臓病



2.次の場合は、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師又は薬剤師に相談してください

- (1) 服用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消 化 器	食欲不振、胃部不快感

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。

その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症 状
間質性肺炎	せきを伴い、息切れ、呼吸困難、発熱等があらわれる。
肝機能障害	全身のだるさ、黄疸（皮ふや白目が黄色くなる）等があらわれる。
偽アルドステロン症	尿量が減少する、顔や手足がむくむ、まぶたが重くなる、手がこわばる、血圧が高くなる、頭痛等があらわれる。

- (2) 1ヵ月位服用しても症状がよくならない場合

3.長期連用する場合には、医師又は薬剤師に相談してください

効 能

色白で疲れやすく汗のかきやすい
傾向のある次の諸症：
肥満症（筋肉にしまりのない、いわゆる
水ぶとり）、むくみ、関節痛



水ぶとり



むくみ

用法・用量

1日3回食前又は食間に水又は白湯にて服用。

年 齢	1 回 量	1日服用回数
成人(15才以上)	4錠	3回
15才未満5才以上	2錠	
5才未満	服用しないこと	

〈用法・用量に関連する注意〉

小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。

成 分

成人1日の服用量12錠（1錠351mg）中、次の成分を含んでいます。
防已黄耆湯エキス粉末…………… 3,200mg
（ボウイ・オウギ各5.0g、バックジュツ・タイソウ各3.0g、カンゾウ1.5g、
シヨウキョウ1.0gより抽出。）

添加物として、タルク、ステアリン酸Mg、二酸化ケイ素、CMC-Ca、
クロスCMC-Na、水酸化Al/Mg、ポリオキシエチレンポリオキシプロ
ピレングリコール、ヒプロメロースを含有する。

〈成分に関連する注意〉

本剤は天然物（生薬）のエキスをを用いていますので、錠剤の色が多少異なることがあります。

保管及び取扱い上の注意

- （1）直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください。
- （2）小児の手の届かない所に保管してください。
- （3）他の容器に入れ替えないでください。
（誤用の原因になったり品質が変わります。）
- （4）ビンの中の詰物は、輸送中に錠剤が破損するのを防ぐためのものです。開栓後は不要となりますので捨ててください。
- （5）使用期限のすぎた商品は服用しないでください。
- （6）水分が錠剤につきますと、変色または色むらを生じることがありますので、誤って水滴を落としたり、ぬれた手で触れないでください。



健康アドバイス

●食事はバランスよく



早食い・ドカ食い・欠食といった食パターンは、栄養のバランスをくずし肥満の原因になります。食べ過ぎや偏食を避け、バランスのとれた食事を心がけましょう。

●適度な運動をしましょう



適度な運動は、血液循環を高めて体の働きを活発にします。スポーツは、心地よい肉体疲労とともに、ストレス解消にもつながります。

包装／60錠・180錠・360錠

本剤について、何かお気づきの点がございましたら、お買い求めのお店又は下記までご連絡いただきますようお願い申し上げます。

クラシエ薬品株式会社 お客様相談窓口 ☎ (03) 5446-3334
受付時間 10：00～17：00（土、日、祝日を除く）

ホームページ www.kracie.co.jp

発 売 元

クラシエ薬品株式会社

東京都港区海岸3-20-20（〒108-8080）

製造販売元

クラシエ製薬株式会社

東京都港区海岸3-20-20（〒108-8080）