

ご使用に際して、この説明文書を必ずお読みください。  
また、必要な時に読めるように大切に保管してください。

第2類医薬品

漢方製剤

# 防風通聖散料エキス顆粒クラシエ

(ボウフウツウショウサン)

## 特 徴

- 「防風通聖散」は、漢方の古典といわれる中国の医書「<sup>センメイロン</sup>宣明論」に収載されている薬方です。
- 便秘がちで、腹部に皮下脂肪が多い方の肥満症、肥満に伴う便秘などに効果があります。

## ⚠ 使用上の注意

### ❌ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)

- 1.本剤を服用している間は、次の医薬品を服用しないでください  
他の瀉下薬（下剤）
- 2.授乳中の方は本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳を避けてください

### 相談すること

- 1.次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください  
(1)医師の治療を受けている人  
(2)妊婦又は妊娠していると思われる人  
(3)体の虚弱な人（体力の衰えている人、体の弱い人）  
(4)胃腸が弱く下痢しやすい人  
(5)発汗傾向の著しい人  
(6)高齢者  
(7)今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人  
(8)次の症状のある人  
むくみ、排尿困難  
(9)次の診断を受けた人  
高血圧、心臓病、腎臓病、甲状腺機能障害
- 2.服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

| 関係部位  | 症 状                  |
|-------|----------------------|
| 皮 膚   | 発疹・発赤、かゆみ            |
| 消 化 器 | 胃部不快感、はげしい腹痛を伴う下痢、腹痛 |

まれに下記の重篤な症状が起こることがある。  
その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

| 症状の名称           | 症 状                                                                |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------|
| 間質性肺炎           | 階段を上ったり、少し無理をしたりすると息切れがする・息苦しくなる、空せき、発熱等がみられ、これらが急にあらわれたり、持続したりする。 |
| 偽アルドステロン症、ミオパチー | 手足のだるさ、しびれ、つっぱり感やこわばりに加えて、脱力感、筋肉痛があらわれ、徐々に強くなる。                    |
| 肝機能障害           | 発熱、かゆみ、発疹、黄疸（皮膚や白目が黄色くなる）、褐色尿、全身のだるさ、食欲不振等があらわれる。                  |

- \* 3.服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
- 下痢
- 4.1ヵ月位（便秘に服用する場合には1週間位）服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
  - 5.長期連用する場合には、医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

## 効 能

体力充実して、腹部に皮下脂肪が多く、便秘がち  
なもの次の諸症：高血圧や肥満に伴う動悸・肩  
こり・のぼせ・むくみ・便秘、蓄膿症（副鼻腔炎）、  
湿疹・皮膚炎、ふきでもの（にきび）、肥満症



## 用法・用量

次の量を1日3回食前又は食間に水又は白湯にて服用。

| 年 齢       | 1回量     | 1日服用回数 |
|-----------|---------|--------|
| 成人（15才以上） | 1包      | 3回     |
| 15才未満7才以上 | 2／3包    |        |
| 7才未満4才以上  | 1／2包    |        |
| 4才未満      | 服用しないこと |        |

### 〈用法・用量に関連する注意〉

小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。

## 成 分

成人1日の服用量3包（1包1.5g）中、次の成分を含んでいます。

防風通聖散料エキス粉末 ……………2,850mg

（トウキ・シャクヤク・センキュウ・サンシシ・レンギョウ・ハッカ・ケイガイ・ボウフウ・マオウ各0.6g、ビャクジュツ・キキョウ・オウゴン・カンゾウ・セッコウ各1.0g、ショウキョウ0.2g、ダイオウ0.75g、乾燥硫酸ナトリウム0.375g、カッセキ1.5gより抽出。）

添加物として、乳糖、ポビドン含有する。

### 〈成分に関連する注意〉

本剤は天然物（生薬）のエキスをを用いていますので、顆粒の色が多少異なることがあります。

## 保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。  
（誤用の原因になったり品質が変わります。）
- (4) 使用期限のすぎた商品は服用しないでください。
- (5) 1包を分割した残りを服用する時は、袋の口を折り返して保管し、2日をすぎた場合には服用しないでください。



### 健康アドバイス

#### ●食事はバランスよく



毎日の便通は健康のバロメーターです。食べ過ぎや偏食を避け、バランスのとれた食事を心がけましょう。特に食物繊維を多く含んだ野菜、芋類、豆類、根菜類などをとりましょう。

#### ●食事はゆっくりよくかんで



早食い・ドカ食い・欠食といった食パターンは、栄養のバランスをくずし肥満の原因になります。ゆっくりとよくかんで食べるほうが、少量でも満腹感が得られます。

#### ●適度な運動をしましょう



適度な運動は、血液循環を高めて腸の働きを活発にします。スポーツは、心地よい肉体疲労とともに、ストレス解消にもつながります。

副作用被害救済制度の問合せ先  
（独）医薬品医療機器総合機構  
<http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai.html>  
☎ 0120-149-931

本剤について、何かお気づきの点がございましたら、お買い求めのお店又は下記までご連絡いただきますようお願い申し上げます。

クラシエ 薬品株式会社 お客様相談窓口 ☎ (03) 5446-3334  
受付時間 10：00～17：00（土、日、祝日を除く）

ホームページ [www.kracie.co.jp](http://www.kracie.co.jp)

発 売 元

**クラシエ 薬品株式会社**

東京都港区海岸3-20-20（〒108-8080）

製造販売元

**クラシエ 製薬株式会社**

東京都港区海岸3-20-20（〒108-8080）