

ご使用に際して、この説明文書を必ずお読みください。  
また、必要な時に読めるように大切に保管してください。

第2類医薬品

漢方製剤

# 「クラシエ」漢方五虎湯エキス顆粒SII

(ゴコトウ)

## 特 徴

- 「五虎湯」は、漢方の古典といわれる中国の医書「<sup>マンビョウカイシヨウ</sup>万病回春」に記載されているせき止めの薬方です。
- 顔を赤くしてせきこむ症状や気管支ぜんそくに効果があります。

## ⚠ 使用上の注意



### 相談すること

#### 1. 次の人は服用前に医師又は薬剤師に相談してください

- (1) 医師の治療を受けている人
- (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人
- (3) 体の虚弱な人（体力の衰えている人、体の弱い人）で軟便、下痢になりやすい人
- (4) 胃腸の弱い人
- (5) 発汗傾向の著しい人
- (6) 高齢者
- (7) 次の症状のある人  
むくみ、排尿困難
- (8) 次の診断を受けた人  
高血圧、心臓病、腎臓病、甲状腺機能障害

#### 2. 次の場合は、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師又は薬剤師に相談してください

- (1) 服用後、次の症状があらわれた場合

| 関係部位  | 症 状           |
|-------|---------------|
| 皮 膚   | 発疹・発赤、かゆみ     |
| 消 化 器 | 悪心、食欲不振、胃部不快感 |

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。

その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

| 症状の名称     | 症 状                                                 |
|-----------|-----------------------------------------------------|
| 偽アルドステロン症 | 尿量が減少する、顔や手足がむくむ、まぶたが重くなる、手がこわばる、血圧が高くなる、頭痛等があらわれる。 |

- \* (2) 1ヵ月位（感冒に服用する場合には5～6日間）服用しても症状がよくならない場合

#### 3. 長期連用する場合には、医師又は薬剤師に相談してください

## \* 効 能

体力中等度以上で、せきが強くでるものの次の諸症：せき、気管支ぜんそく、気管支炎、小児ぜんそく、感冒、痔の痛み



せき



気管支ぜんそく

用法・用量

次の量を1日2回食前又は食間に水又は白湯にて服用。

| 年 齢       | 1回量     | 1日服用回数 |
|-----------|---------|--------|
| 成人（15才以上） | 1包      | 2回     |
| 15才未満7才以上 | 2／3包    |        |
| 7才未満4才以上  | 1／2包    |        |
| 4才未満2才以上  | 1／3包    |        |
| 2才未満      | 服用しないこと |        |

＜用法・用量に関連する注意＞

小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。

成 分

成人1日の服用量2包（1包2.25g）中、次の成分を含んでいます。  
五虎湯エキス粉末M……………1,575mg  
〔マオウ・キョウニン各3.0g、カンゾウ1.5g、セッコウ7.5g、  
ソウハクヒ2.25gより抽出。〕  
添加物として、ヒドロキシプロピルセルロース、乳糖、ポリオキシエチレンポリオキシプロピレングリコールを含有する。

＜成分に関連する注意＞

本剤は天然物（生薬）のエキスをを用いていますので、顆粒の色が多少異なることがあります。

保管及び取扱い上の注意

- (1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2)小児の手の届かない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れ替えないでください。  
（誤用の原因になったり品質が変わります。）
- (4)使用期限のすぎた商品は服用しないでください。
- (5)1包を分割した残りを服用する時は、袋の口を  
折り返して保管し、2日をすぎた場合には服用しないでください。



健康アドバイス

●換気に気を  
つけましょう



空気が汚れていると、せきを誘発することにもつながります。暖房中でも、ときどき窓を開けて新鮮な空気と入れ替えましょう。湿度の低下にも注意してください。

●外出後は  
うがいと手洗いを



人がたくさん集まる場所は、かぜのウイルスも多く、感染しやすくなります。帰宅したら、うがいと手洗いを習慣づけましょう。

●部屋を  
乾燥させない



乾燥した部屋は、のどのためによくありません。加湿器を使って湿度を適度に保つようにしましょう。濡れタオルをつるだけでも加湿効果があります。

副作用被害救済制度の問合せ先  
(独)医薬品医療機器総合機構  
<http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai.html>  
☎ 0120-149-931

本剤について、何かお気づきの点がございましたら、お買い求めのお店又は下記までご連絡いただきますようお願い申し上げます。

クラシエ薬品株式会社 お客様相談窓口 ☎ (03) 5446-3334  
受付時間 10：00～17：00（土、日、祝日を除く）

ホームページ [www.kracie.co.jp](http://www.kracie.co.jp)

発 売 元 **クラシエ薬品株式会社**  
東京都港区海岸3-20-20（〒108-8080）

製造販売元 **クラシエ製薬株式会社**  
東京都港区海岸3-20-20（〒108-8080）