

⚠ 使用上の注意

❌ **してはいけないこと** (守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)

1. 本剤を服用している間は、次の医薬品を服用しないでください。 他の瀉下薬(下剤)
2. 授乳中の人は本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳を避けてください



■ 相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
 - (1) 医師の診療を受けている人
 - (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人
 - (3) 体の虚弱な人(体力の衰えている人、体の弱い人)
 - (4) 胃腸が弱く下痢しやすい人
 - (5) 今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人
2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症 状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	はげしい腹痛を伴う下痢、腹痛

まれに下記の重篤な症状が起こることがある。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症 状
間質性肺炎	階段を上ったり、少し無理をしたりすると息切れがする・息苦しくなる。空せき、発熱等がみられ、これらが急にあらわれたり、持続したりする。
肝機能障害	発熱、かゆみ、発疹、黄疸(皮膚や白目が黄色くなる)、褐色尿、全身のだるさ、食欲不振等があらわれる。

3. 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。 下痢
4. 1ヵ月位(常習便秘、高血圧や肥満に伴う便秘)に服用する場合には5~6日間服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

ご使用に際して、この説明文書を必ずお読みください。
また、必要な時に読めるように大切に保管してください。

第2類 医薬品

販売名：コッコアポG錠

【効能】体力が充実して、脇腹からみぞおちあたりにかけて苦しく、便秘の傾向があるものの次の諸症：胃炎、常習便秘、高血圧や肥満に伴う肩こり・頭痛・便秘、神経症、肥満症

【用法・用量】次の量を1日3回食前又は食間に水又は白湯にて服用。成人(15才以上) 1回4錠、15才未満7才以上 1回3錠、7才未満5才以上 1回2錠、5才未満は服用しないこと

<用法・用量に関連する注意>小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。

【成分】成人1日の服用量12錠(1錠340mg)中、次の成分を含んでいます。

大柴胡湯エキス粉末……………2,700mg
サイコ3.0g、ハンゲ2.0g、ショウキョウ・ダイオウ各0.5g、
オウゴン・ジャクヤク・タイソウ各1.5g、キジツ1.0gより抽出。
添加物として、二酸化ケイ素、クロスCMC-Na、クロスポリ
ドン、ステアリン酸Mgを含有する。

<成分に関連する注意>本剤は天然物(生薬)のエキスを
用いていますので、錠剤の色が多少異なることがあります。

【保管及び取扱い上の注意】

(1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください。(2) 小児の手の届かない所に保管してください。(3) 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わります。)(4) ビンの中の詰物は、輸送中に錠剤が破損するのを防ぐためのものです。開栓後は不要となりますのですぐでください。(5) 使用期限のすぎた商品も服用しないでください。(6) 水分が錠剤につきまると、変色または色むらを生じることがありますので、誤って水滴を落としたり、ぬれた手で触れないでください。

発売元

製造販売元

クラシエ 薬品株式会社 クラシエ 製薬株式会社
東京都港区海岸3-20-20 (〒108-8080) 東京都港区海岸3-20-20 (〒108-8080)
ホム・ム・エジ www.kracie.co.jp

お客様相談窓口 ☎(03)5446-3334
受付時間 10:00~17:00(土、日、祝日を除く)

副作用被害救済制度
の問合せ先
☎0120-419-931