

＊〔用法用量〕のつづき

＜用法用量に関連する注意＞

- (1) 用法用量を厳守すること。
 - (2) 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させること。
 - (3) 就寝前の服用を避けること。
- 〔成分分量〕 1 mL 中
ヒマシ油 0.99 mL 含有
添加物：オレンジ油、ハッカ油
〔保管及び取扱い上の注意〕
- (1) 直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管すること。
 - (2) 小児の手の届かない所に保管すること。
 - (3) 他の容器に入れ替えないこと。
（誤用の原因になったり品質が変わる。）
 - (4) 火気に近づけないこと。
 - (5) 使用期限を過ぎた製品は服用しないこと。

（添付のコップは 10 mL です。）

下 剤

日本薬局方

加香ヒマシ油

Aromatic Castor Oil

20mL

医薬品



製造番号

使用期限



製造発売元

健栄製薬株式会社

大阪市中央区伏見町2丁目5番8号

電話番号 06(6231)5626

ご使用に際して、外箱の説明文を必ずお読みください。
また、必要な時に読めるよう大切に保存してください。

日本薬局方 加香ヒマシ油

〔使用上の注意〕

してはいけないこと

（守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる）

1. 次の人は服用しないこと

- (1) はげしい腹痛又は悪心・嘔吐のある人。
- (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
- (3) 3 歳未満の乳幼児。
- (4) 防虫剤（ナフタリン等）、殺そ剤（猫イラス等）等の薬剤を誤って服用した人。（このような場合は、直ちに医師の治療を受けること。）

2. 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も服用しないこと

駆虫薬、他の瀉下薬（下剤）

3. 授乳中の人は本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳を避けること

4. 連用しないこと

＊以下右側面へ

＊〔使用上の注意〕のつづき

相談すること

1. 次の人は服用前に医師又は薬剤師に相談すること
医師の治療を受けている人。
2. 次の場合は、直ちに服用を中止し、この外箱を持って医師又は薬剤師に相談すること
服用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消 化 器	はげしい腹痛、悪心・嘔吐

3. 次の症状があらわれることがあるので、このような症状の継続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、医師又は薬剤師に相談すること

下剤

〔効能効果〕

腸内容物の急速な排除（食あたり等）

〔用法用量〕

本剤は、下記用量を 1 日 1 回を限度として、必要時、そのまま又は水、牛乳などに浮かべて服用する。

大人（15 歳以上） 20 mL

11 歳以上 15 歳未満 13 mL

7 歳以上 11 歳未満 10 mL

3 歳以上 7 歳未満 6 mL

＊以下右側面へ