





腸内容物の急速な排除に  
20mL  
加香ヒマシ油  
日本薬局方  
第2類医薬品

第2類医薬品

※使用上の注意のつづき  
相談すること 1. 次の人は使用前に医師又は薬剤師に相談してください  
2. 次の場合は、直ちに服用を中止し、この外箱を持って医師又は薬剤師に相談してください  
服用後、次の症状があらわれた場合  
関係部位 症 状  
皮 膚 発疹・発赤、かゆみ  
消 化 器 はげしい腹痛、悪心・嘔吐  
3. 次の症状があらわれることがあるので、このような症状の継続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、医師又は薬剤師に相談してください  
下痢  
【効能効果】  
腸内容物の急速な排除（食あたり等）  
【用法用量】  
本剤は、下記用量を1日1回を限度として、必要時、そのまま又は水、牛乳などに浮かべて服用してください。  
大人（15歳以上） 20mL  
11歳以上15歳未満 13mL  
7歳以上11歳未満 10mL  
3歳以上 7歳未満 6mL  
※以下右側面へ



副作用  
製造番号  
使用期限

※〔用法用量〕のつづき  
〔用法用量に関連する注意〕  
(1)用法用量を厳守してください。(2)小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。  
【成分分量】 1mL中  
ヒマシ油 0.99mL含有  
添加物：オレンジ油、ハッカ油  
【保管及び取扱い上の注意】  
(1)直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管してください。(2)小児の手の届かない所に保管してください。(3)他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わることがあります。)(4)火気に近づけないでください。(5)使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。  
(添付のコップは10mLです。)

副作用被害救済制度の問合せ先  
(独)医薬品医療機器総合機構  
<http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai.html>  
電話 0120-149-931(フリーダイヤル)



第2類医薬品  
下 剤  
日本薬局方  
加香ヒマシ油  
Aromatic Castor Oil 20mL

腸内容物の急速な排除に

健栄製薬株式会社  
大阪市中央区伏見町2丁目5番8号  
電話番号 06(6231)5626

ご使用に際して、外箱の説明文を必ずお読みください。  
また、必要な時に読めるよう大切に保存してください。

第2類医薬品  
日本薬局方 加香ヒマシ油  
使用上の注意  
⊗ してはいいこと (守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)  
1. 次の人は服用しないでください  
(1)はげしい腹痛又は悪心・嘔吐のある人。(2)妊婦又は妊娠していると思われる人。(3)3歳未満の乳幼児。(4)防虫剤(ナフタリン等)、殺そ剤(猫イラズ等)等の薬剤を誤って服用した人。(このような場合は、直ちに医師の治療を受けてください。)  
2. 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も服用しないでください  
駆虫薬、他の瀉下薬(下剤)  
3. 授乳中の人は本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳を避けてください  
4. 連用しないでください  
※以下右側面へ

2010 01  
CII-12 0810