



KENEI・ENEMA

10

ケンエー・浣腸

〔成分分量〕

白濁 グリセリン 50%

添加物：塩化ベンザルコニウム

〔効能効果〕

便秘

〈キャップ式〉

10g×5個入

ケンエー・浣腸

医薬品

ご使用に際して、外箱の説明文を必ずお読みください。また、必要な時に読めるよう大切に保存してください。



使用上の注意



してはいけないこと

連用しないこと（常用すると、効果が減弱し（いわゆる“なれ”が生じ）薬剤にたよりがちになる。）



相談すること

1. 次の人は使用前に医師又は薬剤師に相談すること

- (1) 医師の治療を受けている人。
- (2) 1歳未満の乳児。
- (3) 高齢者。
- (4) はげしい腹痛、悪心・嘔吐、痔出血のある人。
- (5) 心臓病の診断を受けた人。

2. 次の場合は、使用を中止し、この外箱を持って医師又は薬剤師に相談すること
2～3回使用しても排便がない場合

その他の注意

立ちくらみ、肛門部の熱感、不快感があらわれることがある。

【用法用量】

1歳以上8歳未満 1回1包（10g）を直腸内に注入する。

なお、1歳未満の乳児に使用の場合は1回1包（10g）の約半量（約5g）を容器の1/2線により量り直腸内に注入する。

効果のみられない場合にはさらに同量をもう一度注入する。

＜用法用量に記述する注意＞

- (1) 用法用量を厳守すること。
- (2) 本剤使用後は、便意が強まるまで、しばらくがまんすること。
(使用後、すぐに排便を試みると薬剤のみ排出され、効果がみられないことがある。)

- (3) 小児に使用させる場合には、保護者の指導・監督のもとに使用させること。

- (4) 特に乳幼児の場合には、安易な使用を避け、浣腸にたよりすぎないように注意すること。

- (5) 注入に際し、無理に挿入すると直腸粘膜を傷つけるおそれがあるので注意すること。

- (6) 浣腸にのみ使用すること。
(便秘しがちな人のために)

1. 規則的な排便の習慣をつけることが大切で、毎日時間をきめて一定時間トイレに入るよう心がけること。また、便意をもよおしたときは、がまんせずトイレに行くこと。

2. 繊維質の多い食物と水分を多くとるように心がけること。

- (例：野菜類、果物、コンニャク、カンテン、海藻など。)

3. 適度な運動、腹部マッサージなどを行うよう心がけること。

4. 早朝、起きがけに冷たい水又は牛乳等を飲むと便意をもよおしやすくなる。

【保管及び取扱い上の注意】

- (1) 直射日光の当たらない涼しい所に保管すること。

- (2) 小児の手の届かない所に保管すること。

- (3) 他の容器に入れ替えないこと。（誤用の原因になったり品質が変わる。）

- (4) 使用期限を過ぎた製品は使用しないこと。

- (5) 誤用、汚染を避けるため、使用残液は廃棄すること。



健栄製薬株式会社

大阪市中央区伏見町2丁目5番8号
電話番号 06(6231)5626