

4 987286 304113



ご使用に際して、この説明文書を必ずお読みください。
また、必要な時に読めるよう大切に保存してください。

グリセリン浣腸剤

第2類医薬品

ケンエー浣腸L40

KENEI ENEMA L40

ケンエー浣腸L40は、日本薬局方グリセリンの50%水溶液を1個40g充てんした浣腸剤です。容器はさまざまな工夫をこらし、病院で広く用いられている医家向浣腸容器を一般用に製品化したものです。

■ケンエー浣腸L40の特徴

- グリセリンは腸管壁の水分を吸収することに伴う刺激が腸管の蠕動を亢進させます。そのさい、直腸深部にまで送り込むことが効果的です。挿入チューブはロングタイプなので、浣腸液の40gがしっかりと送り込まれ、排便効果を発揮します。
- 浣腸容器はより効果的で安全、しかも使い易い配慮が必要です。細部にわたりさまざまな工夫をこらし、より使い易い機構を備えています。

逆流防止弁付ノズル

浣腸時の不快な液の逆流を防ぎます。

アコーディオン方式容器

握り易く、全量をワンブッシュで注入できます。折り込まれた部分は復元せず、液の残量が少ない独特の方式です。

目盛り挿入チューブ

適度に柔軟性のあるロングタイプなので、浣腸液が直腸深部までとどきます。挿入目安の目盛り入りです。

スライド式ストッパー

チューブの過挿入の危険を防ぎ、肛門にぴったりフィットします。

△ 使用上の注意

❌ してはいけないこと

連用しないでください

〔常用すると、効果が減弱し（いわゆる“なれ”が生じ）薬剤にたよりがちになります。〕



■ 相談すること

1. 次の人は使用前に医師又は薬剤師に相談してください

- (1) 医師の治療を受けている人。
- (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
(流早産の危険性があるので使用しないことが望ましい。)
- (3) 高齢者。
- (4) はげしい腹痛、悪心・嘔吐、痔出血のある人。
- (5) 心臓病の診断を受けた人。

2. 次の場合は、使用を中止し、この文書を持って医師又は薬剤師に相談してください
2～3回使用しても排便がない場合

その他の注意

立ちくらみ、肛門部の熱感、不快感があらわれることがあります。



4 987286 304113



4

【効能効果】便秘

【用法用量】

12歳以上1回1個(40g)を直腸内に注入し、それで効果のみられない場合にはさらに同量をもう一度注入してください。


＜用法用量に関連する注意＞

- (1) 用法用量を厳守してください。
- (2) 本剤使用後は、便意が強まるまで、しばらくがまんしてください。
(使用後、すぐに排便を試みると薬剤のみ排出され、効果がみられないことがあります。)
- (3) 12歳未満の小児には、使用させないでください。
- (4) 注入に際し、無理に挿入すると直腸粘膜を傷つけるおそれがあるので注意してください。
- (5) 浣腸にのみ使用してください。

【便秘しがちな人のために】

1. 規則的な排便の習慣をつけることが大切で、毎日時間をきめて一定時間トイレに入るよう心がけましょう。また、便意をもよおしたときは、がまんせずトイレにいきましょう。

【使用法】



副作用被害救済制度の問合せ先
(独)医薬品医療機器総合機構
<http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai.html>
電話 0120-149-931(フリーダイヤル)

2. 繊維質の多い食物と水分を多くとるように心がけましょう。
(例：野菜類、果物、コンニャク、カンテン、海藻など。)
3. 適度な運動、腹部マッサージなどを行うよう心がけましょう。
4. 早朝、起きがけに冷たい水又は牛乳等を飲むと便意をもよおしやすくなります。

【成分分量】



1個(40g)中 日局グリセリン 20g含有
添加物：エチルパラベン、ブチルパラベン

【保管及び取扱い上の注意】

- (1) 直射日光の当たらない涼しい所に保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わることがあります。)
- (4) 使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。

【包装】

40g×1個入、40g×5個入



★注 意★

1. 無理に挿入すると直腸粘膜を傷つけるおそれがあるので注意してください。
また、挿入する深さは10cm(目盛10)以下にしてください。
2. 加温には60℃以上のお湯を使用しないでください。
3. 浣腸液はゆっくり注入してください。

【お問い合わせ先】

健栄製薬株式会社 学術情報部
〒541-0044 大阪市中央区伏見町2丁目5番8号
電話番号 (06) 6231-5626
FAX番号 (06) 6204-0750
受付時間 9:00～17:00(土、日、祝日を除く)



健栄製薬株式会社
大阪市中央区伏見町2丁目5番8号



4

AX 0810 ③



4 987286 304120