

P

P

外用殺菌消毒薬

日本薬局方

塩化ベンザルコニウム液

ザルコニン[®]液P

ZALKONIN[®] SOLUTION P
(逆性石けん液)

500mL

医薬品



健栄製薬株式会社

大阪府中央区伏見町2丁目5番8号
電話番号 06(6231)5626

必ずうすめて使用すること

使用に際しては、説明書きをよく読んで下さい。

⚠ 使用上の注意

してはいけないこと (守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)

1. 次の部位には使用しないでください
顔面、陰股部(陰のう等)
2. そのままの液では使用しないでください

相談すること 1. 次の人は使用前に医師又は薬剤師に相談してください (1) 医師の治療を受けている人。 (2) 本人又は家族がアレルギー体質の人。 (3) 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人。 (4) 患部が広範囲の人。 (5) 深い傷やひどいやけどの人。

2. 次の場合は、直ちに使用を中止し、この製品を持って医師又は薬剤師に相談してください

(1) 使用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ、かぶれ

- (2) 5～6日間使用しても症状がよくならない場合(創傷面の殺菌消毒、含嗽(うがい))
3. 長期使用する場合には、医師又は薬剤師に相談してください(手指の殺菌消毒)

【効能効果】

手指・創傷面の殺菌・消毒、口腔内の殺菌・消毒

【用法用量】

本品を次のように水で希釈して、塗布または洗浄してください。

1. 手指の殺菌消毒
塩化ベンザルコニウムとして0.05～0.1%
(本品の100～200倍液)
2. 創傷面の殺菌消毒
塩化ベンザルコニウムとして0.01～0.025%
(本品の400～1000倍液)
3. 含嗽(うがい)の場合
塩化ベンザルコニウムとして0.006～0.01%
(本品の1000～2000倍液)



4



キャップ: PP
ボトル: PE
外装フィルム: PP

＜用法用量に関連する注意＞

- (1)用法用量を厳守してください。(2)患部に軽く塗るだけにとどめ、ガーゼ、脱脂綿等に浸して貼付しないでください。(3)そのままの液又は濃縮液が皮膚に付着した場合は、炎症を起こすことがありますので、すぐに水で洗い流してください。(4)小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。(5)目に入らないように注意してください。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗ってください。なお、症状が重い場合には、眼科医の診察を受けてください。(6)石けん類は本剤の殺菌作用を弱めますので、石けん分を洗い流してから使用してください。(7)外用にのみ使用してください。

〔成分分量〕 100 mL中 塩化ベンザルコニウム 10 g含有 (10 w/v%)

＜成分分量に関連する注意＞

- (1)皮革製品に付着した場合は、変質させることがありますので注意してください。
(2)染色した布地は退色することがありますので注意してください。

〔保管及び取扱い上の注意〕

- (1)直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管してください。(2)小児の手の届かない所に保管してください。(3)他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わることがあります。)(4)使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。

〔その他の公衆衛生・家庭衛生分野での使用法〕

1. 食器・器具類の消毒

茶碗、皿、コップ、ナイフ、包丁類、調理器具等は水洗いした後、本品の200～500倍液に5分間以上浸した後水洗いしてください。

2. 家庭・乗物等の消毒

床、畳、家具、調度品、手洗場、浴槽、便所、座席、手すり、電話機等は本品の200～500倍液で拭拭するか又は噴霧してください。

3. 塵芥箱、冷蔵庫の消毒


本品の100～200倍液を噴霧してください。

4. その他

食品工場、清涼飲料水工場、缶詰・製菓工場の施設、器具の消毒には本品の200～500倍液を用いてください。

〔希釈方法〕

- 100 倍液：キャップで下記に示す位置まで本品を2杯とり、水1Lにうすめてください。以下同様にうすめてください。



(キャップ)

- 200 倍液：本品 1杯に水 1 L
- 400 倍液：本品 1杯に水 2 L
- 500 倍液：本品 2杯に水 5 L
- 1000 倍液：本品 1杯に水 5 L
- 2000 倍液：本品 1杯に水 10 L

㊞登録商標

製造
番号
使用
期限

