

消毒用アルコールIP^{ケル}


P

飲用不可

折りたたんで廃棄し
やすいボトルを採用

省資源・ゴミ削減のため、減容
後の容積は約 $\frac{1}{4}$ になります。

- ① 折り目に沿ってつぶす。
- ② 空気が入らないよう、キ
ャップをしめる。



折り目

キャップ：PP
パッキン：PE, PP
ボトル：PE
ラベル：PE

消毒薬

消毒用アルコールIP^{ケル}

アルコール類 * 水溶性 * 危険等級Ⅱ * 火気厳禁

500mL

医薬品



健栄製薬株式会社

大阪市中央区伏見町2丁目5番8号

電話番号 06(6231)5626

使用に際しては、説明書をよく読んでください。

消毒用エタノールIP「ケンエー」

【使用上の注意】

【してはいけないこと】

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)

次の部位には使用しないこと

粘膜(口唇等)、目の周囲

【相関すること】

1. 次の人は使用前に医師又は薬剤師に相談すること

- (1) 医師の治療を受けている人。
- (2) 本人又は家族がアレルギー体質の人。
- (3) 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- (4) 患部が広範囲の人。
- (5) 深い傷やひどいやけどの人。

2. 次の場合は、直ちに使用を中止し、この製品を持って医師又は薬剤師に相談すること

使用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ、はれ、灼熱感

3. 長期使用する場合には、医師又は薬剤師に相談すること

【効能効果】

手指・皮膚の消毒、医療用具の消毒

【用法用量】

塗擦又はガーゼ、脱脂綿等に浸して拭拭する。

(右側面へ続くノ)

(ノ左側面より続く)

〈用法用量に關連する注意〉

- (1) 用法用量を厳守すること。
- (2) 局所刺激作用があるので、軽く塗るだけにどめ、ガーゼ、脱脂綿等に浸して患部に貼付しないこと。
- (3) 過度に使用すると、脱脂綿による皮ふ荒れを起こすことがある。
- (4) 広範囲又は長時間使用する場合には、蒸気の吸入に注意すること。
- (5) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させること。
- (6) 目に入らないように注意すること。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗うこと。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けること。
- (7) 外用にのみ使用し、内服しないこと。

【成分分置】

エタノール(C_2H_5O) 76.9～81.4 vol%を含有する。
添加物としてイソプロパノールを含有する。

〈成分に關連する注意〉

アレルギーテストの検査を受ける場合には、本剤を使用していることを医師に知らせること。(アレルギーテストの検査値に影響をおよぼすことがある。)

【保管及び取扱い上の注意】

- (1) 直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管すること。
- (2) 小児の手の届かない所に保管すること。
- (3) 他の容器に入れ替えないこと。(誤用の原因になったり品質が変わる。)
- (4) 火気に近づけないこと。
- (5) 使用期限を過ぎた製品は使用しないこと。
- (6) 開封時、容器の肩部又は底部をもち、液がとびださないように、キャップを開けること。
- (7) 薬剤が床や家具等に付着しないようにすること。
(変質又は変色のおそれがある。)

【貯法】

気密容器。遮光して、火気を避けて室温保存。

