

貯法：気密容器・室温保存
使用期限：容器等に表示

承認番号	22100APX00558
承認年月	2009 年 7 月
販売開始	2009 年 8 月

ご使用に際して、この説明文書を必ずお読みください。
また、必要な時に読めるよう大切に保存してください。

第 2 類医薬品

外用殺菌消毒剤

滅菌製剤

ステリコン[®]0.05%綿球P

(0.05 % クロルヘキシジングルコン酸塩液含浸綿球)

△ 使用上の注意

※ 【相談すること】

- ※ 1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
- (1) 医師の治療を受けている人。
 - (2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
 - (3) 患部が広範囲の人。
 - (4) 深い傷やひどいやけどの人。
- ※ 2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ

- ※ 3. 5～6 日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

【効 能 効 果】

すり傷、きり傷、かき傷、さし傷、靴ずれ、創傷面の殺菌・消毒

【用 法 用 量】

1 日数回患部に塗布してください。

＜用法用量に関連する注意＞

- (1) 用法用量を厳守してください。
- (2) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (3) 目に入らないように注意してください。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗ってください。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けてください。
- (4) 石けん類は本剤の殺菌作用を弱めるので、石けん分を洗い流してから使用してください。
- (5) 外用にのみ使用してください。

【成 分】

# 20 綿球	綿球 1 球（脱脂綿 0.44 g）あたり 0.05 w/v % クロルヘキシジングルコン酸塩液 4.4 mL 含浸
---------	--

【保管及び取扱い上の注意】

- (1) 直射日光の当たらない涼しい所に保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。（誤用の原因になったり品質が変わることがあります。）
- (4) 使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。
- (5) 開封時及び開封後は、微生物による汚染に注意してください。綿球は清潔なピンセット等を用いて使用し、綿球に指が触れないよう注意してください。
- (6) 開封後は速やかに使用してください。
- (7) 綿の表面又は内部にある小さなしみのような黒又は黄色の斑点状のものは、ワタの種子です。（変質したものではありません。）

【消費者相談窓口】

健栄製薬株式会社 学術情報部
〒541-0044 大阪市中央区伏見町 2 丁目 5 番 8 号
電話番号 (06) 6231-5626
FAX 番号 (06) 6204-0750

副作用被害救済制度の問合せ先
(独) 医薬品医療機器総合機構
<http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai.html>
電話 0120-149-931 (フリーダイヤル)



健栄製薬株式会社
大阪市中央区伏見町2丁目5番8号