

貯法：気密容器・室温保存
使用期限：容器等に表示

承認番号	22400APX00376
承認年月	2012 年 8 月
販売開始	2012 年 9 月

ご使用に際して、この説明文書を必ずお読みください。
また、必要な時に読めるよう大切に保存してください。

第 2 類医薬品

外用殺菌消毒剤

滅菌製剤

ステリコン[®]0.05%綿棒16

(0.05 % クロルヘキシジングルコン酸塩液含浸綿棒)

△ 使用上の注意

【相談すること】

- 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
 - (1) 医師の治療を受けている人。
 - (2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
 - (3) 患部が広範囲の人。
 - (4) 深い傷やひどいやけどの人。
- 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ

- 5 ～ 6 日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

【効 能 効 果】

すり傷、きり傷、かき傷、さし傷、靴ずれ、創傷面の殺菌・消毒

【用 法 用 量】

- 1 日数回患部に塗布してください。

＜用法用量に関連する注意＞

- (1) 用法用量を厳守してください。
- (2) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (3) 目に入らないように注意してください。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗ってください。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けてください。
- (4) 石けん類は本剤の殺菌作用を弱めるので、石けん分を洗い流してから使用してください。
- (5) 外用にのみ使用してください。

【成 分】

# 16 綿棒	綿棒 1 本あたり 0.05 w/v % クロルヘキシジングルコン酸塩液 4.6 mL 含浸
---------	--

【保管及び取扱い上の注意】

- (1) 直射日光の当たらない涼しい所に保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。（誤用の原因になったり品質が変わることがあります。）
- (4) 使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。
- (5) 開封時及び開封後は、微生物による汚染に注意してください。脱脂綿部に指が触れないよう注意してください。
- (6) 開封後は速やかに使用してください。
- (7) 綿の表面又は内部にある小さな黒い点や黄色の斑点状のものは、ワタの種子です。（変質したものではありません。）

【消費者相談窓口】

健栄製薬株式会社 学術情報部
〒 541-0044 大阪市中央区伏見町 2 丁目 5 番 8 号
電話番号 (06) 6231-5626
FAX 番号 (06) 6204-0750

副作用被害救済制度の問合せ先
(独) 医薬品医療機器総合機構
<http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai.html>
電話 0120-149-931 (フリーダイヤル)



健栄製薬株式会社
大阪市中央区伏見町2丁目5番8号