

成分分量 次亜塩素酸ナトリウム 2%

〈成分に関連する注意〉

消毒する製品によっては印刷面、材質等を変色（変質）する
場合があるので注意してください。

保管及び取扱い上の注意

- ①直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管してください。
- ②小児の手の届かない所に保管してください。
- ③他の容器に入れ替えないでください。（誤用の原因になった
り品質が変わることがあります。）
- ④衣類等につくと脱色、変色することがあるので注意してください。
- ⑤使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。

〔貯法〕遮光した気密容器。室温保存。

哺乳びん・ニプルの消毒方法

- ①哺乳びん・ニプルを授乳
後すぐにブラシと食器
用洗剤で洗い、水でよく
すすいでください。
- ②哺乳びん・ニプルを消毒
溶液（本剤の160倍液）
中に完全に沈め、次の
授乳まで1時間以上浸
漬させます。消毒溶液
は、24時間ごとに新しく
調製してください。
- ③調乳の直前に哺乳びん・
ニプルを取り出し、消毒
溶液をよく振りきって使
用してください。

哺乳びん・ニプルの浸漬



哺乳びん・ニプルを、中に気泡が
残らないように消毒溶液中に完
全に沈め、次の授乳まで1時間以
上浸漬させます。消毒溶液は、24時
間ごとに新しく調製してください。

販売元：ビーンスターク・スノー株式会社
東京都新宿区本塩町13 TEL.0120-241-537
製造販売元：健栄製薬株式会社
大阪市中央区伏見町2丁目5番8号

BeanStalk は、大塚製薬株式会社の商標です。

登録商標


キャップ：PP
パッキン：PE、PP
ボトル：PE
ラベル：PS

K0G9

2%

500mL

ビーンスターク
Bean
Stalk



哺乳びん・乳首・医療器具等消毒液

ジアエン液[®] 2%

次亜塩素酸ナトリウム2w/v%



使用上の注意（使用前に必ずお読みください）

相談すること：使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ち
に使用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位：皮膚

症状：あれ、発疹・発赤、かゆみ

第2類医薬品

まぜるな
危険

酸性の洗浄・漂白剤、シアンール酸系の製品と混合する
と塩素ガスが発生して危険ですのでおやめください。

効能効果・用法用量

効能効果	用法用量	濃度	消毒溶液1L調製時の ジアエン液2%の必要量
哺乳びん・ 乳首の消毒	哺乳びん・乳首を洗浄、水 洗いた後、本剤の160倍 液に1時間以上浸して ください。	0.0125%	6.25mL
医療器具の 消毒	本剤の40～100倍液に 数分間浸すか、清拭して ください。	0.02～0.05%	10～25mL
器具・物品 などの消毒	本剤の40～100倍液に 数分間浸すか、清拭して ください。	0.02～0.05%	10～25mL
室内・便所・ 浴室の消毒	本剤の40～100倍液で 清拭してください。	0.02～0.05%	10～25mL
排泄物の消毒	本剤の2～20倍液を用い てください。	0.1～1%	50～500mL

〈用法用量に関連する注意〉

- ①用法用量を厳守してください。（熱湯での希釈は避けてください。）
- ②目に入らないように注意してください。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬる
ま湯で洗ってください。
なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けてください。
- ③酸性の洗浄・漂白剤、シアンール酸系の製品等との混合は危険なので避けてください。
- ④金属製の容器は、変質することがあるので、用いないでください。また、哺乳びん、
サミ・スプーン等の金属製品や指輪等を消毒溶液につけることも避けてください。
- ⑤調製後、消毒溶液が変色した場合は、水質が本剤には不適当なので、その水での本
剤の使用を避けてください。
- ⑥化学繊維、皮革、毛、絹製品への使用を避けてください。
- ⑦あやまって飲みこんだ場合は、すぐに水・生卵・ミルク等を飲み、医師に相談してく
ださい。



製造番号

使用期限