

〔使用上の注意〕

【相談すること】

次の場合は、服用を中止し、この製品を持って医師又は薬剤師に相談してください。

- しばらく服用しても症状がよくなる場合。

〔効能・効果〕

滋養強壮、虚弱体質、肉体疲労・病中病後・食欲不振・栄養障害・発熱性消耗性疾患・産前産後などの場合の栄養補給

〔用法・用量〕

成人（15歳以上）

1回1瓶（100mL）

1日1回服用してください。

- 15歳未満は服用しないでください。

- 用法・用量を厳守してください。

副作用救済制度 ☎0120-149-931

ガラス：瓶

金属：キャップ

0NA1

SANRIKISO Z3000II

滋養強壮・肉体疲労時などの栄養補給

サンリキソZ3000II



第2類医薬品

100mL

〔成分・分量〕1日量1瓶（100mL）中 登録品目番号24-467

ゴオウ浸出液5mg（ゴオウ0.5mgに相当）、ローヤルゼリーチンキ50mg（ローヤルゼリー50mgに相当）、チアミン塩化物10mg、リボフラビンリン酸エステルナトリウム5mg、ピリドキシン塩酸塩12mg、ニコチン酸アミド30mg、無水カフェイン50mg、タウリン3000mg、アスパラギン酸カリウム・マグネシウム等量混合物200mg、カルニチン塩化物100mg、L-バリン60mg、L-ロイシン120mg、L-イソロイシン60mg、L-アルギニン塩酸塩60mg（アルコール 0.2mL以下）

添加物として、白糖、D-ソルビトール、スクラロース、DL-リンゴ酸、カラメル、安息香酸Na、パラベン、ポリリン酸Na、pH調整剤、エタノール、グリセリン、香料を含有する。

- 本剤に含まれるビタミンB2により、尿が黄色になることがあります。
- 本剤は生薬成分を含むため、まれに沈澱を生じることがありますが、薬効に変わりありません。

〔保管及び取扱い上の注意〕

- (1)直射日光の当たらない涼しい所に保管してください。
- (2)小児の手のとどかない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れ替えないでください。（誤用の原因になったり品質が変わります）
- (4)使用期限の過ぎた製品は使用しないでください。

1瓶（100mL）中74.6kcal

¥300＋税

製造販売元 株式会社廣 貫 堂

富山市梅沢町2丁目9-1
（お問い合わせ先）電話076-424-2259

使用
期限

製造
記号

