

## 〔使用上の注意〕

## 【相談すること】

しばらく服用しても症状がよくなり  
ない場合は服用を中止し、こ  
の製品を持って医師、薬剤師  
又は登録販売者に相談してく  
ださい。

## 〔効能・効果〕

滋養強壮、虚弱体質、肉体疲労・  
病中病後・食欲不振・栄養障害・  
発熱性消耗性疾患・産前産後  
などの場合の栄養補給

## 〔用法・用量〕

成人（15歳以上）

1回1瓶（100mL）

1日1回服用してください。

●15歳未満は服用しないでくだ  
さい。

●用法・用量を厳守してください。

副作用救済制度 ☎0120-149-931

ガラス：瓶

金 属：キャップ

22A2

# SANRIKISO Z3000II

滋養強壮・肉体疲労時などの栄養補給

サンリキソZ3000II

タウリン  
3000mg  
牛黄  
ロイヤルゼリー  
BCAA配合  
バリン  
ロイシン  
イソロイシン

アミノ酸配合

第3類医薬品

100mL

〔成分・分量〕1日量1瓶（100mL）中 登録品目番号24-467

ゴオウ浸出液5mg（ゴオウ0.5mgに相当）、  
ロイヤルゼリーチンキ50mg（ロイヤルゼリー  
50mgに相当）、チアミン硝酸塩10mg、リボ  
フラビンリン酸エステルナトリウム5mg、ピ  
リドキシン塩酸塩12mg、ニコチン酸アミド  
30mg、無水カフェイン50mg、タウリン3000mg、  
アスパラギン酸カリウム・マグネシウム等  
量混合物200mg、カルニチン塩化物100mg、  
L-バリン60mg、L-ロイシン120mg、L-イソ  
ロイシン60mg、L-アルギニン塩酸塩60mg  
（アルコール0.2mL以下）

添加物として、白糖、D-ソルビトール、ス  
クラロース、DL-リンゴ酸、カラメル、安息  
香酸Na、パラベン、ポリリン酸Na、pH調  
整剤、エタノール、グリセリン、香料を含有  
する。

●本剤に含まれるビタミンB2により、尿が黄色  
になることがあります。

●本剤は生薬成分を含むため、まれに沈殿を生  
じることがありますが、薬効に変わりありません。

## 〔保管及び取扱い上の注意〕

(1)直射日光の当たらない涼しい所に保管してください。

(2)小児の手のとどかない所に保管してください。

(3)他の容器に入れ替えないでください。

（誤用の原因になったり品質が変わります）

(4)使用期限の過ぎた製品は使用しないでください。

1瓶（100mL）中74.6kcal

¥300＋税

使用  
期限

製造  
記号

製造販売元 株式会社廣 貫 堂

富山市梅沢町2丁目9-1

（お客様相談窓口）電話076-424-2259

