

【成分・分量】1日量3本(90mL)中

葛根湯エキス …… 8300mg

〔カコン 8.0g、マオウ 4.0g、タイソウ 4.0g、ケイヒ 3.0g、
シヤクヤク 3.0g、カンゾウ 2.0g、シヨウキョウ 1.0g〕より製した
エキス添加物として、白糖、D-ソルビトール、果糖ブドウ糖液糖、ポリオキ
シエチレン硬化ヒマシ油、安息香酸Na、パラベン、エタノール、グリ
セリン、トメントール、プロピレングリコール、バニリン、ベンジルアル
コール、香料を含有する。【効能・効果】かぜの初期の諸症状(発熱、寒け、頭痛、肩・
首筋のこわばり、鼻閉、鼻水、のどの痛み)【用法・用量】成人(15歳以上)1回1本(30mL)、1日3回食間
によく振ってから服用してください。〈用法・用量に関連する注意〉(1)用法・用量を厳守してくださ
い。(2)15歳未満の小児には服用させないでください。(3)成人
(15歳以上)は1回1本とし、1日3本を超えて服用しないでくださ
い。(4)本剤は1回1本の服用で飲みきり、飲み残しのないように
してください。【保管及び取扱い上の注意】(1)直射日光の当たらない涼
しい所に保管してください。(2)小児の手のとどかない所に保管
してください。(3)他の容器に入れ替えないでください。(誤用
の原因になったり品質が変わります。)(4)使用期限の過ぎた製
品は使用しないでください。

製造販売元 株式会社 廣胃堂

富山市南沢町2丁目9-1

(お客様相談窓口)電話076-424-2259

副作用救済制度 ☎ 0120-149-931

¥450+税

72A2

使用期限

製造記号

本剤は本質的に沈殿物を含んでおります
ので、よく振ってから服用してください。

△ 使用上の注意

☒ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副
作用が起こりやすくなります)

短期間の服用にとどめ、連用しないでください

☒ 相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は
登録販売者に相談してください。(1)医師
の治療を受けている人。(2)妊婦又は妊
娠していると思われる人。(3)体の虚弱な
人(体力の衰えている人、体の弱い人)。
(4)胃腸の弱い人。(5)発汗傾向の著しい
人。(6)高齢者。(7)今までに薬などにより
発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある
人。(8)次の症状のある人。むくみ、排尿
困難(9)次の診断を受けた人。高血圧、
心臓病、腎臓病、甲状腺機能障害
2. 服用後、次の症状があらわれた場合は
副作用の可能性があるため、直ちに服用
を中止し、この製品を持って医師、薬剤師
又は登録販売者に相談してください

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	吐き気、食欲不振、胃部不快感

まれに下記の重篤な症状が起こることが
あります。その場合は直ちに医師の診療
を受けてください。

症状の名称	症 状
偽アルドス テロン症、 ミオパチー	手足のだるさ、しびれ、つばり 感やこわばりに加えて、脱力 感、筋肉痛があらわれ、徐々に 強くなる。
肝機能障害	発熱、かゆみ、発疹、黄疸(皮 膚や白目が黄色くなる)、褐色 尿、全身のだるさ、食欲不振等 があらわれる。

3. 5〜6回服用しても症状がよくならない場
合は服用を中止し、この製品を持って医師、
薬剤師又は登録販売者に相談してください

ガラス:瓶 金属:キャップ

かぜの初期症状に
葛根湯寒け、発熱、鼻づまり、
肩・首筋のこわばり

葛根 生姜 桂皮

大棗 甘草 麻黄 芍薬



眠け成分ゼロ 液体かぜ薬

葛根湯内服液N

30mL

第2類医薬品