

使用上の注意 相談すること

しばらく服用しても症状がよくなりえない場合は服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

効能・効果

滋養強壮、虚弱体質、肉体疲労・病中病後・食欲不振・栄養障害・発熱性消耗性疾患・産前産後などの場合の栄養補給

用法・用量

用法・用量を厳守してください

成人(15歳以上) 1日1回 1回1瓶(100mL)

15歳未満は服用しないでください

保管及び取扱い上の注意

1.直射日光の当たらない涼しい所に保管してください。2.小児の手のとどかない所に保管してください。3.他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり、品質が変わります)4.使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。

副作用被害救済制度 ☎0120(149)931

発売元 株式会社 NYグローバル

富山市東中野町1丁目1-1  
(お問い合わせ先)電話 076-424-5515

製造販売元 株式会社 廣貴堂

富山市梅沢町2丁目9-1

ガラス：瓶、金属：キャップ 87A1

HapYcom

第2類医薬品

からだ全体がだるいときに



MERJOHN-DX

4000α

マージョンDX4000αゼロ

Z 糖類ゼロ  
ZERO

タウリン 3000mg  
※  
アミノ酸類 1000mg

3種類の生薬成分

のみやすい青りんご風味

100mL

成分・分量 1日量1瓶(100mL)中

インヨウカク流エキス0.1mL(インヨウカク100mgに相当)、ショウキョウエキス9.7mg(ショウキョウ100mgに相当)、ローヤルゼリーチンキ50mg(ローヤルゼリー50mgに相当)、チアミン硝酸化物10mg、リボフラビンリン酸エステルナトリウム5mg、ピリドキシン塩酸塩5mg、ニコチン酸アミド30mg、無水カフェイン50mg、タウリン3000mg、アスパラギン酸カリウム・マグネシウム等量混合物200mg、カルニチン塩化物60mg、グリシン240mg、L-リシン塩酸塩300mg、L-アルギニン塩酸塩60mg、L-バリン35mg、L-ロイシン70mg、L-イソロイシン35mg

添加物：アセスルファムK、スクラロース、シクロデキストリン、カラメル、クエン酸水和物、DL-リンゴ酸、ポリリン酸Na、安息香酸Na、パラベン、pH調整剤、エタノール、グリセリン、プロピレングリコール、香料

●本剤に含まれているリボフラビンリン酸エステルナトリウムにより、尿が黄色くなることがあります。●本剤は生薬成分を含むため、まれに沈殿を生じることがありますが、薬効には変わりありません。

1瓶(100mL)あたり 18kcal

※アミノ酸類(L-バリン/L-ロイシン/L-イソロイシン/L-アルギニン塩酸塩/アスパラギン酸カリウム・マグネシウム等量混合物/カルニチン塩化物/L-リシン塩酸塩/グリシン)

使用  
期限

製造  
記号



MADE IN JAPAN