

かぜの 初期症状に

液体の
かぜ薬

ハイカゼ内服液S

さむけ
発熱
鼻水

のどの痛み

葛根湯

エキス製剤

満量処方

第2類医薬品 30mL

△ 使用上の注意

☒ **してはいけないこと** (守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)

短期間の服用にとどめ、連用しないでください

☒ **相談すること** 1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください (1) 医師の治療を受けている人。 (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。 (3) 体の虚弱な人 (体力の衰えている人、体の弱い人)。 (4) 胃腸の弱い人。 (5) 発汗傾向の著しい人。 (6) 高齢者。 (7) 今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。 (8) 次の症状のある人。 むくみ、排尿困難 (9) 次の診断を受けた人。 高血圧、心臓病、腎臓病、甲状腺機能障害 2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	吐き気、食欲不振、胃部不快感

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症 状
偽アルドステロン症、ミオパチー	手足のだるさ、しびれ、つばり感やこわばりに加えて、脱力感、筋肉痛があらわれ、徐々に強くなる。
肝機能障害	発熱、かゆみ、発疹、黄疸 (皮膚や白目が黄色くなる)、褐色尿、全身のだるさ、食欲不振等があらわれる。

3.5~6回服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

登録品目番号 24-538

【成分・分量】1日量3本 (90mL) 中

葛根湯エキス…………… 8300mg

〔カクコン8g、マオウ4g、タイソウ4g、ケイヒ3g〕より製したエキス
〔シャクヤク3g、カンゾウ2g、ショウキョウ1g〕

添加物として、白糖、D-ソルビトール、果糖ブドウ糖液糖、ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油、安息香酸Na、パラベン、エタノール、グリセリン、トメントール、プロピレングリコール、バニリン、ベンジルアルコール、香料を含有する。

【効能・効果】 かぜの初期症状 (発熱、さむけ、頭痛、肩・首筋のこわばり、鼻閉、鼻水、のどの痛み)

【用法・用量】 成人 (15歳以上) 1回1本 (30mL)、1日3回食間に服用してください。まれに微量の沈殿が生じる場合があるので、よく振ってから服用してください。● (1) 用法・用量を厳守してください。 (2) 15歳未満の小児には服用させないでください。 (3) 成人 (15歳以上) は1回1本とし、1日3本を超えて服用しないでください。 (4) 本剤は1回1本の服用で飲みきり、飲み残しのないようにしてください。

【保管及び取扱い上の注意】 (1) 直射日光の当たらない涼しい所に保管してください。 (2) 小児の手のとどかない所に保管してください。 (3) 他の容器に入れ替えないでください。 (服用の原因になったり品質が変わります。) (4) 使用期限の過ぎた製品は使用しないでください。

製造販売元 株式会社 廣買堂

富山市梅沢町2丁目9-1

(お客様相談窓口) 電話076-424-2259

副作用救済制度 ☎ 0120-149-931

ガラス:瓶
金 属:キャップ

使用期限

製造記号