

項目	内容		
医薬品区分	一般用医薬品		
薬効分類	葛根湯		
承認販売名	葛根湯内服液 K		
製品名	葛根湯内服液 K		
製品名（読み）	カクコントウナイフクエキケイ		
製品の特徴			
使用上の注意	■相談すること 1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください (1) 医師の治療を受けている人。 (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。 (3) 体の虚弱な人（体力の衰えている人、体の弱い人）。 (4) 胃腸の弱い人。 (5) 発汗傾向の著しい人。 (6) 高齢者。 (7) 今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。 (8) 次の症状のある人。 むくみ、排尿困難 (9) 次の診断を受けた人。 高血圧、心臓病、腎臓病、甲状腺機能障害 2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください 〔関係部位：症状〕 皮膚：発疹・発赤、かゆみ 消化器：吐き気、食欲不振、胃部不快感 まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。 〔症状の名称：症状〕 偽アルドステロン症、ミオパチー：手足のだるさ、しびれ、つっぱり感やこわばりに加えて、脱力感、筋肉痛があらわれ、徐々に強くなる。 肝機能障害：発熱、かゆみ、発疹、黄疸（皮膚や白目が黄色くなる）、褐色尿、全身のだるさ、食欲不振等があらわれる。 <u>多形紅斑：皮膚が広い範囲で赤くなる、水疱が皮膚の赤い部分にあらわれる、高熱、のどの痛み等が持続したり、急激に悪化する。</u>※ 3. 1ヵ月位（感冒の初期、鼻かぜ、頭痛に服用する場合には5～6回）服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください 4. 長期連用する場合には、医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください		
効能・効果	体力中等度以上のものの次の諸症：感冒の初期（汗をかいていないもの）、鼻かぜ、鼻炎、頭痛、肩こり、筋肉痛、手や肩の痛み		
効能関連注意			
用法・用量	成人（15歳以上）1回1本（30mL）、1日3回食間によく振ってから服用してください。		
用法関連注意	(1) 用法・用量を厳守してください。 (2) 15歳未満の小児には服用させないでください。 (3) 本剤は1回1本の服用で飲みきり、飲み残しのないようにしてください。		
成分分量	1日量3本(90mL)中		
	成分	分量	内訳
	葛根湯エキス	4310mg	(カクコン8.0g、マオウ4.0g、タイソウ4.0g、ケイヒ3.0g、シャクヤク3.0g、カンゾウ2.0g、ショウキョウ1.0g)
添加物	D-ソルビトール、果糖ブドウ糖液糖、アセスルファムK、スクラロース、ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油、グリセリン脂肪酸エステル、安息香酸Na、パラベン、エタノール、プロピレングリコール、バニリン、香料、着色料（カラメル）		
保管及び取扱い上の注意	(1) 直射日光の当たらない涼しい所に保管してください。 (2) 小児の手のとどかない所に保管してください。 (3) 他の容器に入れ替えないでください。（誤用の原因になったり品質が変わります。） (4) 使用期限の過ぎた製品は使用しないでください。		
消費者相談窓口	会社名：株式会社廣貴堂 問い合わせ先：お客様相談窓口 電話番号：076-424-2259 問合せ先受付時間：月～金 9:00～17:00（祝日を除く）		
製造販売会社	株式会社廣貴堂 添付文書情報 会社名：株式会社廣貴堂 住所：富山市梅沢町2丁目9-1		
販売会社			
剤形	液剤		
リスク区分等	第2類医薬品		