



ご使用前にこの添付文書を必ずお読みください。
また、必要時にそなえて大切に保管してください。

第2類医薬品

便秘治療剤

ビューラック・ソフト

食生活の欧米化に伴い、便秘で悩んでいる方が増えています。**ビューラック・ソフト**は胃・小腸ではほとんど作用せず、大腸で活性化されて効果をあらわす刺激性下剤で、大腸の蠕動（ぜんどう）運動を促進し、おやすみ前に服用することにより、翌朝にはおだやかなお通じが期待できる便秘薬です。



⚠️[使用上の注意]

してはいけないこと ❌

（守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります）

1. 本剤を服用している間は、次の医薬品を服用しないでください。
他の瀉下薬（下剤）
2. 大量に服用しないでください。

相談すること 📞

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師または登録販売者に相談してください。
（1）医師の治療を受けている人。
（2）妊婦または妊娠していると思われる人。
（3）次の症状のある人。
はげしい腹痛、吐き気・嘔吐
2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この添付文書を持って医師、薬剤師または登録販売者に相談してください。

関係部位	症 状
消化器	はげしい腹痛、吐き気・嘔吐

3. 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続または増強が見られた場合には、服用を中止し、医師、薬剤師または登録販売者に相談してください。
下痢
4. 1週間位服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この添付文書を持って医師、薬剤師または登録販売者に相談してください。

（裏面もお読みください）

【成分】 1日量（3錠）中

ピコスルファートナトリウム水和物……………7.5mg
添加物として、乳糖水和物、セルロース、ヒドロキシプロピルセルロース、クロ
スポビドン、ヒプロメロース、白糖、タルク、酸化チタン、アラビアゴム、ポビ
ドン、カルナウバロウ、ステアリン酸マグネシウム、赤色3号を含有します。

【効能・効果】

便秘
便秘に伴う次の症状の緩和：頭重、のぼせ、肌あれ、吹出物、食欲不振（食欲減
退）、腹部膨満、腸内異常醗酵、痔

【用法・用量】

次の1回量を就寝前（または空腹時）に水またはお湯でかまずに服用してください。
ただし、初回は最小量を用い、便通の具合や状態をみながら少しずつ増量または減量
してください。


年 齢	1 回 量	1日服用回数
成人（15歳以上）	2～3錠	1 回
15歳未満の小児	服用しないこと	

<用法・用量に関連する注意>

- （1）定められた用法・用量を厳守してください。
- （2）錠剤の取り出し方

右図のように錠剤の入っている
PTPシートの凸部を指先で強
く押して裏面のアルミ箔を破り、
取り出してお飲みください。（誤
ってそのまま飲み込んだりすると
食道粘膜に突き刺さる等思わ
ぬ事故につながります。）

〈PTPシートの取り出し図〉



【保管および取扱い上の注意】

- （1）直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- （2）小児の手の届かない所に保管してください。
- （3）誤用をさけ、品質を保持するために他の容器に入れかえないでください。
- （4）使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。

本製品についてのご相談は、お客様相談窓口までお願い致します。
お客様相談窓口 フリーダイヤル 0120-023520
受付時間 平日9：00～17：00（土、日、祝日を除く）

兵庫県尼崎市長洲本通2丁目8番27号

皇漢堂製薬株式会社