



ご使用前にこの添付文書を必ずお読みください。
また、必要時にそなえて大切に保管してください。

第②類医薬品

のどの痛み・鼻水・発熱に

総合かぜ薬「クニヒロ」

かぜは、万病の元と言われますが、かぜをひくと体力がなくなり、いろいろな病気を誘発する原因にもなります。大事に至らないよう、かぜをひいたと思えば早めに適切な治療をすることが大切です。

総合かぜ薬「クニヒロ」は、かぜの様々な症状をおさえる成分6種類にビタミンCを配合した総合かぜ薬です。



⚠️【使用上の注意】

してはいけないこと ❌

（守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなります）

1. 次の人は服用しないでください。

- (1) 本剤によるアレルギー症状を起こしたことがある人。
- (2) 本剤または他のかぜ薬、解熱鎮痛薬を服用してぜんそくを起こしたことがある人。

2. 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も服用しないでください。

他のかぜ薬、解熱鎮痛薬、鎮静薬、鎮咳去痰薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬（鼻炎用内服薬、乗物酔い薬、アレルギー用薬）

3. 服用後、乗物または機械類の運転操作をしないでください。

（眠気があらわれることがあります。）

4. 服用時は飲酒しないでください。

5. 長期連用しないでください。

相談すること 🗣️

1. 次の人は服用前に医師または薬剤師に相談してください。

- (1) 医師または歯科医師の治療を受けている人。
- (2) 妊婦または妊娠していると思われる人。
- (3) 授乳中の人。

(4) 水痘（水ぼうそう）若しくはインフルエンザにかかっているまたはその疑いのある乳・幼・小児（15歳未満）。

(5) 高齢者。

(6) 本人または家族がアレルギー体質の人。

(7) 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人。

(8) 次の症状のある人。

高熱、排尿困難

(9) 次の診断を受けた人。

甲状腺機能障害、糖尿病、心臓病、高血圧、肝臓病、腎臓病、胃・十二指腸潰瘍、緑内障

2. 次の場合は、直ちに服用を中止し、この添付文書を持って医師または薬剤師に相談してください。

(1) 服用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
皮 膚	発 疹 ・ 発 赤 、 か ゆ み
消 化 器	悪 心 ・ 嘔 吐 、 食 欲 不 振
精 神 神 経 系	めまい
そ の 他	排尿困難

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症 状
ショック (アナフィラキシー)	服用後すぐにじんましん、浮腫、胸苦しさ等とともに、顔色が青白くなり、手足が冷たくなり、冷や汗、息苦しさ等があらわれる。
皮膚粘膜眼症候群 (スティーブンス・ジョンソン症候群) 中毒性表皮壊死症 (ライエル症候群)	高熱を伴って、発疹・発赤、火傷様の水ぶくれ等の激しい症状が、全身の皮膚、口や目の粘膜にあらわれる。
肝機能障害	全身のだるさ、黄疸（皮膚や白目が黄色くなる）等があらわれる。
間質性肺炎	空せき（たんを伴わないせき）を伴い、息切れ、呼吸困難、発熱等があらわれる。 （これらの症状は、かぜの諸症状と区別が難しいこともあり、空せき、発熱等の症状が悪化した場合にも、服用を中止するとともに、医師の診療を受けること。）
ぜんそく	

(2) 5～6回服用しても症状がよくなる場合

3. 次の症状があらわれることがあるので、このような症状の継続または増強が見られた場合には、服用を中止し、医師または薬剤師に相談してください。

□のかわき

[成分と作用] 1日量（9錠）中

成 分	含量 (9錠中)	作 用
アセトアミノフェン	270mg	発熱、頭痛、関節の痛み、筋肉の痛みをやわらげます。
エテンザミド	1050mg	
デキストロメトルファン 臭化水素酸塩水和物	48mg	せきをしずめます。
dl-メチルエフェドリン塩酸塩	60mg	気管支をひろげ、せきをしずめてたんを出やすくします。
クロルフェニラミンマレイン酸塩	7.5mg	抗ヒスタミン作用により、くしゃみ、鼻水、鼻づまりの症状をおさえます。
無水カフェイン	75mg	頭痛をやわらげます。
アスコルビン酸カルシウム	500mg	ビタミンCを補います。

添加物として、乳糖水和物、セルロース、ヒドロキシプロピルセルロース、クロスポビドン、ヒプロメロース、酒石酸、マクロゴール、酸化チタン、カルナウバロウ、ステアリン酸マグネシウムを含有します。

[効能・効果]

かぜの諸症状（鼻水、鼻づまり、くしゃみ、のどの痛み、せき、たん、悪寒、発熱、頭痛、関節の痛み、筋肉の痛み）の緩和

[用法・用量]

次の1回量を食後なるべく30分以内に水またはお湯でかまずに服用してください。

年 齢	1 回 量	1 日服用回数
成人（15歳以上）	3 錠	3 回
11歳以上15歳未満	2 錠	
5歳以上11歳未満	1 錠	
5歳未満の乳幼児	服用しないこと	



<用法・用量に関連する注意>

- (1) 定められた用法・用量を厳守してください。
- (2) 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。

[保管および取扱い上の注意]

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 誤用をさけ、品質を保持するために他の容器に入れかえないでください。
- (4) ビンの中の詰め物は、輸送中の錠剤の破損を防止するために入れてありますので、フタをあけた後はすててください。
- (5) 箱およびビンの「開封年月日」記入欄に、開封した日付を記入し、ビンがこの文書とともに箱に入れたまま保管してください。
- (6) 使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。

本製品についてのご相談は、お客様相談窓口までお願い致します。
お客様相談窓口 フリーダイヤル 0120-023520
受付時間 平日9：00～17：00（土、日、祝日を除く）

兵庫県尼崎市長洲本通2丁目8番27号

皇漢堂製薬株式会社