

ご使用前にこの添付文書を必ずお読みください。  
また、必要時にそなえて大切に保管してください。



第2類医薬品

漢方製剤  
芍薬甘草湯顆粒「クニヒロ」



(シャクヤクカンゾウトウ顆粒)

「芍薬甘草湯（しゃくやくかんぞうとう）」は、一般的に筋肉がけいれんして、急激におこる筋肉の強い痛みが出た方や運動中や就寝中に足がつる方、たまに運動するとこむらがりや腰痛を起こす方におすすめの漢方製剤です。

⚠️ [使用上の注意]

してはいけないこと ❌

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)

1. 次の人は服用しないでください。

- (1) 7歳未満の小児。
- (2) 次の診断を受けた人。

心臓病

2. 症状があるときのみの服用にとどめ、連用しないでください。

相談すること 🗣️

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師または登録販売者に相談してください。

- (1) 医師の治療を受けている人。
- (2) 妊婦または妊娠していると思われる人。
- (3) 高齢者。
- (4) 次の症状のある人。

むくみ

- (5) 次の診断を受けた人。

高血圧、腎臓病

2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性がありますので、直ちに服用を中止し、この添付文書を持って医師、薬剤師または登録販売者に相談してください。

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症 状
間質性肺炎	階段を上ったり、少し無理をしたりすると息切れがする・息苦しくなる、空せき、発熱等がみられ、これらが急にあらわれたり、持続したりする。
偽アルドステロン症、ミオパチー	手足のだるさ、しびれ、つっぱり感やこわばりに加えて、脱力感、筋肉痛があらわれ、徐々に強くなる。
うっ血性心不全、心室頻拍	全身のだるさ、動悸、息切れ、胸部の不快感、胸が痛む、めまい、失神等があらわれる。
肝機能障害	発熱、かゆみ、発疹、黄疸（皮膚や白目が黄色くなる）、褐色尿、全身のだるさ、食欲不振等があらわれる。

3. 5～6回服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この添付文書を持って、医師、薬剤師または登録販売者に相談してください。

(裏面もお読みください)

## [成分] 1日量(3包)中

成分	含量
芍薬甘草湯エキス (シャクヤク6g、カンゾウ6gより抽出)	2.4g

添加物として、乳糖水和物、ステアリン酸マグネシウムを含有します。

## [効能・効果]

体力に関わらず使用でき、筋肉の急激なけいれんを伴う痛みのあるものの次の諸症：こむらがり、筋肉のけいれん、腹痛、腰痛

## [用法・用量]

次の1回量を食前または食間に水または白湯で服用してください。

年齢	1回量	1日服用回数
成人(15歳以上)	1包	3回
7歳以上15歳未満	2/3包	
7歳未満の小児	服用しないこと	

## [保管および取扱い上の注意]

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れかえないでください。(誤用の原因になったり品質が変わります。)
- (4) 使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。
- (5) 1包を分割した残りを服用するときは、袋の口を折り返して保管し、2日を過ぎた場合には服用しないでください。

本製品についてのご相談は、お客様相談窓口までお願い致します。

お客様相談窓口 フリーダイヤル 0120-023520

受付時間 平日9:00~17:00(土、日、祝日を除く)

副作用被害救済制度のお問い合わせ先

(独)医薬品医療機器総合機構

[http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai\\_camp/index.html](http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai_camp/index.html)

電話 0120-149-931(フリーダイヤル)

兵庫県尼崎市長洲本通2丁目8番27号

**皇漢堂製薬株式会社**