



解熱鎮痛薬

ねむくならない／頭痛薬

N-ECH[®]S

第②類医薬品

- ねむくならない・・・ノーイチSには、ねむくなる成分が入っておりませんので車の運転中にも、ビジネス中にも服用できます。
- 早く効きます・・・ノーイチSは微粉末の製剤になっていますので、胃の中で早く溶け、早く効きます。
- 胃にソフト・・・ノーイチSには、胃障害の少ない成分が配合されています。

〔⚠ 使用上のご注意〕

してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなります)

1. 次の人は服用しないで下さい。
 - (1)本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
 - (2)本剤又は他の解熱鎮痛薬、かぜ薬を服用してぜんそくを起こしたことがある人。
2. 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も服用しないで下さい。
他の解熱鎮痛薬、かぜ薬、鎮静薬
3. 服用前後は飲酒をしないで下さい。
4. 長期連用しないで下さい。

相談すること

1. 次の人は服用前に医師、歯科医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。
 - (1)医師又は歯科医師の治療を受けている人。
 - (2)妊婦又は妊娠していると思われる人。
 - (3)水痘(水ぼうそう)若しくはインフルエンザにかかっている又はその疑いのある乳・幼・小児(15才未満)。
 - (4)高齢者。
 - (5)薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
 - (6)次の診断を受けた人。
心臓病、腎臓病、肝臓病、胃・十二指腸潰瘍
2. 服用後、次の症状があらわれた場合には副作用の可能性があるため、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。

関係部位	症 状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	吐き気・嘔吐、食欲不振
精神神経系	めまい
その他	過度の体温低下

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けて下さい。

症状の名称	症 状
ショック (アナフィラキシー)	服用後すぐに皮膚のかゆみ、じんましん、声のかすれ、くしゃみ、のどのかゆみ、息苦しさ、動悸、意識の混濁等があらわれる

(⇒裏面に続きます)

症状の名称	症 状
皮膚粘膜眼症候群 (ステイプルス・ジョンソン症候群) 中毒性表皮壊死融解症、 急性汎発性発疹性膿疱症	高熱、目の充血、目やに、唇のただれ、のどの痛み、皮膚の 広範囲の発疹・発赤、赤くなった皮膚上に小さなブツブツ (小膿疱)が出る、全身がだるい、食欲がない等が持続したり、 急激に悪化する
肝機能障害	発熱、かゆみ、発疹、黄疸(皮膚や白目が黄色くなる)、褐色 尿、全身のだるさ、食欲不振等があらわれる
腎障害	発熱、発疹、全身のむくみ、全身のだるさ、関節痛(節々が 痛む)、下痢等があらわれる
間質性肺炎	階段を上ったり、少し無理をしたりすると息切れがする・息 苦しくなる、空せき、発熱等がみられ、これらが急にあらわ れたり、持続したりする
ぜんそく	息をするときゼーゼー、ヒューヒューと鳴る、息苦しい等が あらわれる

3.5～6回服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この文書を持って医師、
歯科医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。

効能・効果

- 1) 頭痛・歯痛・抜歯後の疼痛・咽喉痛・耳痛・関節痛・神経痛・腰痛・筋肉痛・肩こり
痛・打撲痛・骨折痛・ねんざ痛・月経痛(生理痛)・外傷痛の鎮痛
- 2) 悪寒・発熱時の解熱

用法・用量

年令区分	1回量
15才以上	1包
7～14才	½包
3～6才	¼包

左記1回量を1日3回を限度とし、なるべく空腹
時をさけて服用して下さい。
服用間隔は4時間以上おいて下さい。

- お子さまに服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させて下さい。
- 用法及び用量をお守り下さい。
- 3才未満のお子さまには服用させないで下さい。

成分・分量

本品1日量(3包)中

1包量0.6g

成 分	分 量	作 用
アセトアミノフェン	450mg	頭痛・歯痛・関節の痛み・発熱等にすばやい効 果があります。
エテンザミド	750mg	他成分の働きを助けます。
無水カフェイン	240mg	他成分の働きを助けます。

添加物として、合成ケイ酸Al、リン酸水素Ca水和物、バレイシヨデンブ、メタケイ酸アルミ
ン酸Mg、無水ケイ酸を含有します。

保管・取扱上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管して下さい。
- (2) お子さまの手の届かない所に保管して下さい。
- (3) 他の容器に入れ替えないで下さい。(誤用の原因になったり、品質が変わることがあります)
- (4) 使用期限の過ぎた製品は服用しないで下さい。
- (5) 1包を分割した残りを使用する場合には、袋の口を折り返して保管し、2日以内に使用して下さい。

消費者ご相談窓口

本剤をご使用になり、何かお気づきの点がございましたら下記発売元までご連絡いただきます
様お願い申し上げます。

発売元 **N-IT** 薬品株式会社 大阪府松原市高見の里4丁目8番16号
お客様相談室：072-331-0417
受付時間：9時から17時まで(土、日、祝日を除く)

製造販売元 株式会社 廣 昌 堂 富山県射水市水戸田2841