

噴射式口腔咽喉薬

のどの荒れと痛みに

フィニッシュコーマ

フィニッシュコーマは、ノドやお口の中に、やさしいマスカットの風味がフワッとひろがるノド用治療薬です。フィニッシュコーマをノドの患部にピュッピュッと噴射しますと、効きめの成分が患部に直接当たり、ノドを正常な状態に治してくれます。

- かぜの場合なら、ノドの粘膜に付着した細菌を直接退治して、ノドのハレと痛みをとります。
- 声を出しすぎてノドに負担をかけたり、汚染空気の刺激などによりノドを痛めた場合には、荒れてしまったノドが気持ちよく治ってまいります。

⚠ 使用上の注意

❌ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)

1. 次の人は使用しないこと

本剤によるアレルギー症状を起こしたことがある人。

2. 長期連用しないこと



相談すること

1. 次の人は使用前に医師又は薬剤師に相談すること

- (1) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
- (2) 授乳中の人。
- (3) 本人又は家族がアレルギー体質の人。
- (4) 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- (5) 次の症状のある人。
口中のひどいただれ
- (6) 次の診断を受けた人。
甲状腺機能障害

2. 次の場合は、直ちに使用を中止し、この添付文書を持って医師又は薬剤師に相談すること

(1) 使用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
口	あれ、しみる、灼熱感、刺激感
消化器	悪心、吐気
その他	不快感

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けること。

症状の名称	症 状
ショック（アナフィラキシー）	使用後すぐにじんましん、浮腫、胸苦しさ等とともに、顔色が青白くなり、手足が冷たくなり、冷や汗、息苦しさがあらわれる。

(2) 5～6日間使用しても症状がよくならない場合

効能・効果

のどの炎症によるのどのあれ・のどのいたみ・のどのはれ・のどの不快感・声がれ

用法・用量

1日数回適量をのどの粘膜面に噴射塗布して用いる。

<用法・用量に関連する注意>

(1) 用法・用量を守ること。

- (2) 息を吸いながら使用すると、液が気管支や肺に入ることがあるので、ノズルをのどの患部にむけて、ア〜ッと声を出しながら、ピュッピュッと2～3回直射すること。

- (3) 目に入らないよう注意すること。万一目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗い、直ちに眼科医の診療を受けること。
- (4) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させること。
- (5) 塗布にのみ使用すること。



＜容器の正しい使い方＞

■この容器はポンプストッパーがついており、ノズルを反対方向にまわさないと、液が出ないようになっています。

1 まず、このままの状態です、必ずキャップをはずす。	2 ノズルを反対方向にまわすと、ポンプが作動状態になる。	3 頭部を押しながら、液を患部に2～3回直射する。	4 使用後はノズルをもとの位置にもどし、しっかりキャップをはめる。
--	--	---	---

※最初にお使いになるときは、液が出るまで4～5回押してください。
 ※ノズルがもとの位置にもどっていないか、キャップがしっかりと閉まっているか、キャップがはずれたり、液もれするおそれがありますので注意してください。

成分・分量(1mL中)

ボピドンヨード 4.5mg


〔添加物〕ヨウ化K、グリセリン、エタノール、香料、L-メントール、フェニルエチルアルコール、プロピレングリコール

＜成分・分量に関連する注意＞


本剤の使用により、銀を含有する歯科材料（義歯等）が変色することがある。

保管及び取扱上の注意

- (1) 高温をさけ、直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管すること。
- (2) 小児の手の届かない所に保管すること。
- (3) 他の容器に入れ替えないこと。（誤用の原因になったり品質が変わる。）
- (4) 本剤が衣類や寝具などに付着した時は、なるべく早く水が洗剤で洗い落とすこと。
- (5) プラスチック類、塗装面等に付着すると変質することがあるので、付着しないように注意すること。
- (6) 火気に近づけないこと。
- (7) 液が出なくなったり、不衛生になるので、キャップをしっかりとめ、ゴミが付着しないようにすること。
- (8) キャップをしたまま噴射すると、キャップを飲みこむおそれがあるので、必ずキャップをとってから噴射すること。
- (9) 使用期限（外箱及び容器に記載）をすぎた製品は使用しないこと。



フィニッシュコーツMを携帯する時は、添付のグリーンの袋に入れてください。



本製品に関するお問い合わせは
 興和株式会社 医薬事業部 くすり相談室へお願いします。
 〒103-8433 東京都中央区日本橋本町三丁目4-14
 TEL 03-3279-7755 FAX 03-3279-7566
 電話受付時間：月～金（祝日を除く）9:00～17:00



製造販売元 興和株式会社

東京都中央区日本橋本町三丁目4-14