

●使用上の注意 / 相殺すること

次の場合は、直ちに服用を中止し、この製品を持って医師又は薬剤師に相談すること

(1)服用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症状
皮膚	発疹等

(2)しばらく服用しても症状がよくならない場合

●用法・用量 / 成人(15歳以上)

1回1本、1日1回服用する。

○用法・用量を厳守すること。

●成分・分量(50mL中) / ロクジョウチンキ
0.1mL(ロクジョウとして28.6mg) 塩化カル
ニチン 50.0mg オキソアミジン 100.0mg
ニンジン乾燥エキス45.0mg(ニンジンとして
671.6mg)チアミン硝化物10.0mg/リボフラ
ビンリン酸エステルナトリウム 5.0mg ビリドキ
シン塩酸塩10.0mgニコチン酸アミド25.0mg
無水カフェイン 50.0mg [添加物]白糖、
D-ソルビトール、DL-リンゴ酸、クエン酸、
クエン酸Na、パラベン、安息香酸Na、香料、
エタノール、プロピレングリコール、グリセリン
○リボフラビンリン酸エステルナトリウムにより、尿が黄色になることがある。○生薬成分配合のため、まれに混濁を生じることもある。

製造 興和株式会社
販売元 東京都中央区日本橋本町三丁目4-14
製造 滋賀県製薬株式会社
滋賀県甲賀市甲賀町通 679

使用期限

製造番号

Kowa

強壮生薬エキス配合ドリンク剤

三和D_{コーフ}
100α

第3類医薬品

●効能・効果 / 滋養強壮、虚弱体質、肉体的疲労・

病後の体力低下・食欲不振・栄養障害・

発熱性消耗性疾患・妊娠授乳期などの

場合の栄養補給

H8S

50mL



●保管及び取

扱い上の注意 /

(1)高温を避け、

直射日光の当た

らない涼しい所

に保管すること。

(2)小児の手の

届かない所に保管すること。

(3)他の

容器に入れ替えないこと。(誤用の原

因になったり品質が変わる。)(4)使用

期限をすぎた製品は服用しないこと。

○お問い合わせ先

興和(株)

お客様相談センター

TEL 03-3279-7755



金属:キャップ ガラス:瓶

ビタミン含有保健薬

副作用被害救済制度の問合せ先

(独)医薬品医療機器総合機構

http://www.pmda.go.jp/

☎ 0120-149-931