

第2類医薬品

Kowa

30mL×3本(1日分)

コルゲンコーワ 液体かぜ薬

かぜのひきはじめに効く

〈かぜの初期症状〉

- 寒け・発熱
- ふしぶしの痛み

ま お う と う
麻黄湯

眠くなる
成分を含んで
いません。



この説明文書は本剤とともに保管し、
服用の際には、よくお読みください。

開け口



使用上の注意

してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)

1. 次の人は服用しないこと

体の虚弱な人(体力の衰えている人、体の弱い人)。

2. 短期間の服用にとどめ、連用しないこと

相談すること

1. 次の人は服用前に医師又は薬剤師に相談すること

(1) 医師の治療を受けている人。

(2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。

(3) 胃腸の弱い人。

(4) 発汗傾向の著しい人。

(5) 高齢者。

(6) 今までに薬により発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。

(7) 次の症状のある人。

むくみ、排尿困難

(8) 次の診断を受けた人。

高血圧、心臓病、腎臓病、甲状腺機能障害

2. 次の場合は、直ちに服用を中止し、この説明文書を持

って医師又は薬剤師に相談すること

(1) 服用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
消 化 器	悪心、食欲不振、胃部不快感
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
そ の 他	発汗過多、全身脱力感

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けること。

症状の名称	症 状
偽アルドステロン症	尿量が減少する、顔や手足がむくむ、まぶたが重くなる、手がこわばる、血圧が高くなる、頭痛等があらわれる。

(2) 5～6回服用しても症状がよくならない場合

■効能・効果

風邪のひきはじめて、さむけがして発熱、頭痛があり、身体のふしふしが痛い場合の次の諸症：感冒、鼻かぜ

■用法・用量

下記の量を食前又は食間によく振ってから服用する。

年 齢	1回量	1日服用回数
成人(15歳以上)	1本	3回
15歳未満の小児	服用しないこと	

●食間とは「食事と食事の間」のことで、たとえば朝食と昼食の間のことをさします。食事中に服用するということではありません。

＜用法・用量に関連する注意＞

(1) 用法・用量を厳守すること。

(2) 本剤は生薬成分配合のため、沈殿を生じることがあるので、服用の際にはピンをよく振ること。

■成分・分量(90mL中)

本品90mL(30mL×3本)中、以下の生薬より抽出した麻黄湯エキス81mLを含有する。

マオウ 5.0g ケイヒ 4.0g キョウニン 5.0g カンゾウ 1.5g
〔添加物〕白糖、パラベン、香料、エタノール、プロピレングリコール

■保管及び取扱い上の注意

(1) 高温をさけ、直射日光の当たらない涼しい所に保管すること。

(2) 小児の手の届かない所に保管すること。

(3) 他の容器に入れ替えないこと。(誤用の原因になったり品質が変わる。)

(4) 使用期限(外箱及びラベルに記載)をすぎた製品は服用しないこと。

(5) ピンをあけたら飲みきること。

(6) ピンをあけたまま保存しないこと。

漢方製剤

コルゲンコーワ 液体かぜ薬

ま お う と う
麻黄湯

第2類医薬品

本製品に関するお問い合わせは
興和株式会社 医薬事業部
お客様相談センターへお願いします。
〒103-8433

東京都中央区日本橋本町三丁目4-14

TEL 03-3279-7755

FAX 03-3279-7566

電話受付時間：月～金(祝日を除く)
9:00～17:00

副作用被害救済制度の問合せ先
(独)医薬品医療機器総合機構

<http://www.pmda.go.jp/>

☎ 0120-149-931

製造 興 和 株 式 會 社
販売元 東京都中央区日本橋本町三丁目4-14