

ご使用に際して、この添付文書を必ずお読み下さい。  
また、必要な時に読めるよう大切に保管して下さい。

トコン末・カンゾウ末配合

医薬品

# せき・たんに **ジスコール** せきどめ錠

せきやたんは、かぜや気管支炎などの時に起こる典型的な症状ですが、激しいせきが  
続くと、のどや気管支の粘膜を痛めるだけでなく、体力の消耗を招いたり、睡眠や安  
静がさまたげられたりして、病氣自体の回復を遅らせたり、二次感染をひき起こす恐  
れもありますので、早めに治療することが大切です。

ジスコールせきどめ錠は、激しいせきをしずめるとともに、のどにからんだしつこ  
いたんの粘りを下げてとりやすくするトコン末や、炎症を起こしているのどや気管支  
粘膜を保護し、たんを出しやすくするカンゾウ末などを配合し、せきやたんに優れた  
効果をあらわします。



## 使用上の注意



### してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなる)

1. 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も服用しないこと  
他の鎮咳去痰薬、かぜ薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬(鼻炎用内服薬、  
乗物酔い薬、アレルギー用薬)、鎮静薬
2. 服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないこと(眠気があらわれることが  
ある)
3. 本剤は、5才未満の乳幼児に服用させないこと



### 相談すること

1. 次の人は服用前に医師又は薬剤師に相談すること
  - (1) 医師の治療を受けている人。
  - (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
  - (3) 授乳中の人。
  - (4) 高齢者。
  - (5) 本人又は家族がアレルギー体質の人。
  - (6) 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
  - (7) 次の診断を受けた人。  
高熱、排尿困難
  - (8) 次の診断を受けた人。  
心臓病、高血圧、糖尿病、緑内障、甲状腺機能障害
2. 次の人は直ちに服用を中止し、この文書を持って医師又は薬剤師に相談する  
こと

- (1) 服用後、次の症状が現れた場合

| 関係部位  | 症 状        |
|-------|------------|
| 皮 膚   | 発疹・発赤、かゆみ  |
| 消 化 器 | 悪心・嘔吐、食欲不振 |
| 精神神経系 | めまい        |
| そ の 他 | 排尿困難       |

- (2) 5～6回服用しても症状がよくなる場合
3. 次の症状があらわれることがあるので、このような症状の継続又は増強がみ  
られた場合には、服用を中止し、医師又は薬剤師に相談すること  
便秘、口のかわき