

COTD



服用前に、この説明文書を必ずお読みください。また、必要な時に読めるよう本剤とともに大切に保管してください。

Ｌ-システイン配合製剤
販売名：キミエホホワイト

第3類医薬品

【特徴】

・キミエホホワイトは、Ｌ-システイン・ビタミンＣなどを配合したビタミン剤で、しみやそばかすのもとになる黒色メラニンの生成を抑制し、皮膚の代謝をスムーズにし、メラニンの排出を促します。

・ビタミンＢ₂とニコチン酸アミドが皮膚の新陳代謝を促進し、Ｌ-システインとビタミンＣの働きを助けて効果を高めます。

Ｌ-システイン

メラニン色素の生成を抑えて、色素沈着を改善します。

アスコルビン酸

皮膚や粘膜の正常な働きを助けるとともに抗酸化作用を持つビタミンです。

ニコチン酸アミド

皮膚や粘膜を正常に保つ働きがあります。

リボフラビン

皮膚・粘膜の正常な働きを助けるビタミンです。

お問い合わせ 株式会社富山常備薬

☎ 0120-432-093

受付時間：9時～18時(年中無休)

副作用被害救済制度 ☎ 0120-149-931

製造販売元 五洲薬品株式会社
富山県富山市花園町 1-1-5

発売元 株式会社富山常備薬
富山県富山市丸の内 1-8-17

開封年月日

年 月 日

【成分・分量】1日量(6錠)中

成分	分量
Ｌ-システイン	160mg
アスコルビン酸(ビタミンC)	500mg
ニコチン酸アミド	60mg
リボフラビン(ビタミンB ₂)	12mg

添加物として、セルロース、無水ケイ酸、ヒドロキシプロピルセルロース、ステアリン酸Mg、ヒプロメロース、白糖、タルク、アラビアゴム末、ゼラチン、酸化チタン、ポリオキシエチレンポリオキシプロピレングリコール、炭酸Ca及びカルナウバロウを含有する。

【成分・分量に関連する注意】

・本剤の服用により尿が黄色くなる場合がありますが、これは本剤に含まれているリボフラビン(ビタミンB₂)によるもので心配ありません。

・ビタミンCの服用により、尿および大便の検査値に影響を及ぼすことがありますので、尿および大便の検査を受ける場合には、本剤を服用していることを医師にお知らせしてください。

【効能・効果】

1. 次の諸症状の緩和：しみ、そばかす、日やけ・かぶれによる色素沈着
2. 次の場合の出血予防：歯ぐきからの出血、鼻出血
「ただし、これらの症状について、1ヵ月ほど使用しても改善が見られない場合は、医師、薬剤師又は歯科医師に相談してください。」
3. 次の場合のビタミンCの補給：肉体的疲労時、妊娠・授乳期、病中病後の体力低下時、老年期

【用法・用量】

次の量を食後服用してください。

年 齢	1回量	1日服用回数
15歳以上	2錠	3回
7歳以上15歳未満	1錠	
7歳未満	服用しないでください	

【用法・用量に関連する注意】

・小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。

®登録商標

AS4041210928

第3類医薬品

KIMIE WHITE

キミエホホワイト®

Ｌ-システイン・アスコルビン酸(ビタミンC)
ニコチン酸アミド・リボフラビン(ビタミンB₂)

第3類医薬品

顔・背中・腕 しみ
そばかす
飲んで効く医薬品

KIMIE WHITE 30日分180錠
キミエホホワイト®

有効成分

Ｌ-システイン
アスコルビン酸(ビタミンC)
ニコチン酸アミド
リボフラビン(ビタミンB₂)



富山常備薬

使用期限

製造番号



紙箱



詰め物



4 580544 060020

△使用上の注意

■相談すること

1. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。



関係部位	症状
消化器	吐き気・嘔吐

2. 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。 下痢
3. 1ヵ月位服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この文書を持って医師、歯科医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

【保管及び取り扱い上の注意】

- (1) 直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。
(誤用の原因になったり品質が変わることがあります。)
- (4) 容器の中の詰め物は、開封後に捨ててください。詰め物を捨てたのちは、落下等の衝撃で錠剤破損(糖衣の欠け)が生じることがありますので、取り扱いには注意してください。(詰め物は、錠剤が輸送中に破損するのを防止するためのものです。)
- (5) 服用の都度、容器のフタをしっかりと閉めてください。
(吸湿し品質が変わることがあります。)
- (6) 使用期限の過ぎた製品は服用しないでください。
- (7) 箱の「開封年月日」記入欄に、開封した日付を記入してください。

