

服用に際しては、この説明文書を必ずお読みください。
また必要な時に読めるように大切に保管してください。



漢方製剤

ケイジップ® S 「コタロー」

けい し かじゅつ ぶ とう
(桂枝加朮附湯エキス錠)

商品番号

S094

本剤は、江戸時代の漢方医学者吉益東洞が著した「方機」収載の処方にもとづいてつくられたエキスを、飲みやすく錠剤としたものです。

四肢の関節が痛み、時には腫れたり、また肩、顔面や手足などの神経に沿って痛んだり、逆にマヒ感があると、耐えがたく日常生活に支障を来すこともまれではありません。医学的な原因は一樣ではありませんが、寒冷や湿気が誘因になったり、悪化を招くことが多いものです。

ケイジップSは、体内の「湿毒」を除き、また全身の血行をよくし、体を温めながら痛みを緩和する漢方薬です。

また日常生活にも気をつけて、根気よく治すことが大切です。



使用上の注意



相談すること

1. 次の人は服用前に医師または薬剤師に相談してください

- (1) 医師の治療を受けている人。
- (2) 妊婦または妊娠していると思われる人。
- (3) のぼせが強く赤ら顔で体力の充実している人。
- (4) 高齢者。
- (5) 今までに薬により発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。
- (6) 次の症状のある人。

むくみ

- (7) 次の診断を受けた人。

高血圧、心臓病、腎臓病

2. 次の場合は、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師または薬剤師に相談してください

- (1) 服用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
その他	どうき、のぼせ、ほてり

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症状
偽アルドステロン症	尿量が減少する、顔や手足がむくむ、まぶたが重くなる、手がこわばる、血圧が高くなる、頭痛等があらわれる。

- (2) 1ヵ月位服用しても症状がよくならない場合

3. 長期連用する場合には、医師または薬剤師に相談してください

【効能・効果】

神経痛、関節痛。

【用法・用量】

食前または食間に服用してください。

食間とは……食後2～3時間を指します。

年 齢	1 回 量	1 日服用回数
大人（15歳以上）	4錠	3回
15歳未満7歳以上	3錠	
7歳未満5歳以上	2錠	
5歳未満	服用しないでください	

＜用法・用量に関連する注意＞

小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。



【成分・分量】

成分・分量（本剤12錠中）		
ケイヒ……………2.00 g	シャクヤク……………2.00 g	タイソウ……………2.00 g
ショウキョウ……0.50 g	カンゾウ……………1.00 g	ソウジュツ……………2.00 g
ブシ末2（ホウブシ末）…0.50 g		
より抽出した水製エキス2.65 gを含有しています。		

添加物として酸化チタン、ステアリン酸マグネシウム、タルク、ヒドロキシプロピルメチルセルロース2910、粉末飴、メタケイ酸アルミン酸マグネシウム、カラメル、カルナウバロウ、サラシミツロウを含有しています。

【保管及び取扱い上の注意】

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。
(誤用の原因になったり品質が変わる場合があります。)
- (4) 水分が錠剤に付きますと、品質の劣化をまねきますので、誤って水滴を落したり、ぬれた手で触れないでください。
- (5) 湿気などにより薬が変質することがありますので、服用後は、ビンのフタをよくしめてください。
- (6) 使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。



【包装】

180錠 540錠

製品内容についてのお問い合わせは、お買い求めのお店、または下記にお願い申し上げます。

小太郎漢方製薬株式会社 医薬事業部 お客様相談室

大阪市北区中津2丁目5番23号 TEL06(6371)9106

受付時間 9:00～17:30（土、日、祝日を除く）

製造販売元



漢方をよりよく より多くの人に

小太郎漢方製薬株式会社

〒531-0071 大阪市北区中津2丁目5番23号

TEL 06 (6371) 9106