



漢方製剤

ノーザ® A「コタロー」

商品番号

S070

本剤は、漢方の古典「傷寒論」^{しょうかんろん}（後漢時代）収載の薬方を基本とした我が国の経験処方にもとづいてつくられたエキスを、飲みやすく錠剤としたものです。

近年、食生活や環境の変化などにより蓄膿症^{ちくのうしょう}や慢性鼻炎などの鼻の病気が増えています。

「鼻がスッカリしない」のは非常にうっとうしく、またつらいものです。

ノーザAは、鼻づまりを中心に、膿汁^{のうじゅう}などの症状を伴うような場合に用いて効果があります。



使用上の注意



相談すること

1. 次の人は服用前に医師または薬剤師に相談してください

- (1) 医師の治療を受けている人。
- (2) 妊婦または妊娠していると思われる人。
- (3) 体の虚弱な人（体力の衰えている人、体の弱い人）。
- (4) 胃腸の弱い人。
- (5) 発汗傾向の著しい人。
- (6) 高齢者。
- (7) 今までに薬により発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。
- (8) 次の症状のある人。

むくみ、排尿困難

- (9) 次の診断を受けた人。

高血圧、心臓病、腎臓病、甲状腺機能障害

2. 次の場合は、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師または薬剤師に相談してください

- (1) 服用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
消化器	悪心、食欲不振、胃部不快感
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症 状
偽アルドステロン症	尿量が減少する、顔や手足がむくむ、まぶたが重くなる、手がこわばる、血圧が高くなる、頭痛等があらわれる。

- (2) 1 ヶ月位服用しても症状がよくならない場合

3. 長期連用する場合には、医師または薬剤師に相談してください

【効能・効果】

鼻づまり、蓄膿症、慢性鼻炎

【用法・用量】

食前または食間に服用してください。

食間とは……食後2～3時間を指します。

年 齢	1 回 量	1 日服用回数
大人（15歳以上）	3錠	3回
15歳未満7歳以上	2錠	
7歳未満5歳以上	1錠	
5歳未満	服用しないでください	

＜用法・用量に関連する注意＞

小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。


【成分・分量】

成分・分量（本剤9錠中）					
カッコン	2.00 g	マオウ	2.00 g	ケイヒ	1.00 g
シャクヤク	1.00 g	タイソウ	1.50 g	ショウキョウ	0.50 g
カンゾウ	1.00 g	センキュウ	1.50 g	シンイ	1.50 g
より抽出した水製エキス2.25 gを含有しています。					

添加物として含水二酸化ケイ素、酸化チタン、ステアリン酸マグネシウム、タルク、トウモロコシデンプン、乳糖、ヒドロキシプロピルメチルセルロース2910、粉末飴、メタケイ酸アルミン酸マグネシウム、カラメル、カルナウバロウ、サラシミツロウを含有しています。

【保管及び取扱い上の注意】

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。
(誤用の原因になったり品質が変わる場合があります。)
- (4) 水分が錠剤に付きますと、品質の劣化をまねきますので、誤って水滴を落したり、ぬれた手で触れないでください。
- (5) 湿気などにより薬が変質することがありますので、服用後は、ビンのフタをよくしめてください。
- (6) 使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。



【包装】

153錠 460錠

製品内容についてのお問い合わせは、お買い求めのお店、または下記にお願い申し上げます。

小太郎漢方製薬株式会社 医薬事業部 お客様相談室

大阪市北区中津2丁目5番23号 TEL06(6371)9106

受付時間 9:00～17:30(土、日、祝日を除く)

製造販売元



漢方をよりよく より多くの人に

小太郎漢方製薬株式会社

〒531-0071 大阪市北区中津2丁目5番23号

TEL 06 (6371) 9106