

第2類医薬品

漢方製剤



しょうふうさん

消風散 エキス細粒G「コタロー」

商品番号

D177

消風散エキス細粒G「コタロー」は、体の内面から皮膚の病変を治していくお薬です。

一般に局部に滲出物があつて発赤したり、かさぶたをつくったりして、かゆみの強い湿疹に用いられます。

近年は食生活や生活環境の変化に伴い、アトピー性皮膚炎のような体質的な湿疹が増えています。刺激性的飲食物を避けるなどの食生活に気をくばり、患部をいつも清潔にしておくことも大切です。



使用上の注意



してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなります)

次の人は服用しないでください

生後3ヵ月未満の乳児。



相談すること

1. 次の人は服用前に医師または薬剤師に相談してください

- (1) 医師の治療を受けている人。
- (2) 妊婦または妊娠していると思われる人、体の弱い人。
- (3) 体の虚弱な人（体力の衰えている人、体の弱い人）。
- (4) 胃腸が弱く下痢しやすい人。

2. 次の場合は、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師または薬剤師に相談してください

- (1) 服用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症状
消化器	食欲不振、胃部不快感、腹痛

- (2) 1ヵ月位服用しても症状がよくなるらない場合

3. 次の症状があらわれることがありますので、このような症状の継続または増強が見られた場合には、服用を中止し、医師または薬剤師に相談してください

下痢

4. 本剤の服用により、まれに症状が進行することもありますので、このような場合には、服用を中止し、医師または薬剤師に相談してください

【効能・効果】

慢性湿疹（分泌物の多いもの）

【用法・用量】

食前または食間に服用してください。

食間とは……食後2～3時間を指します。

年齢	1回量	1日服用回数
大人（15歳以上）	1包	3回
15歳未満7歳以上	2/3包	
7歳未満4歳以上	1/2包	
4歳未満2歳以上	1/3包	
2歳未満	1/4包	

＜用法・用量に関連する注意＞

- (1) 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。
- (2) 1歳未満の乳児には、医師の診療を受けさせることを優先し、止むを得ない場合にのみ服用させてください。

【成分・分量】

成分・分量 本剤3包(7.2g)中		
トウキ……………2.4g	モクツウ……………1.6g	センタイ……………0.8g
ジオウ……………2.4g	ゴボウシ……………1.6g	クジン……………0.8g
セッコウ……………2.4g	チモ……………1.2g	ケイガイ……………0.8g
ハマボウフウ……………1.6g	ゴマ……………1.2g	カンゾウ……………0.8g
ソウジュツ……………1.6g		

より抽出した水製エキス4.8gを含有しています。

添加物としてステアリン酸マグネシウム、トウモロコシデンプン、乳糖水和物、プルラン、メタケイ酸アルミン酸マグネシウムを含有しています。

【保管及び取扱い上の注意】

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。
(誤用の原因になったり品質が変わることがあります)
- (4) 水分が付きますと、品質の劣化をまねきますので、誤って水滴を落したり、ぬれた手で触れないでください。
- (5) 1包を分割した残りを服用する場合には、袋の口を折り返しで保管し、2日以内に服用してください。
- (6) 使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。



本剤は生薬を原料としていますので、製品により多少色が異なることがありますが、品質・効果に変わりはありません。

製品内容についてのお問い合わせは、お買い求めのお店、または下記にお願い申し上げます。
小太郎漢方製薬株式会社 医薬事業部 お客様相談室
大阪市北区中津2丁目5番23号 TEL06 (6371) 9106
受付時間 9:00～17:30 (土、日、祝日を除く)

製造販売元 漢方をよりよく より多くの人に



小太郎漢方製薬株式会社

〒531-0071 大阪市北区中津2丁目5番23号

TEL 06 (6371) 9106

AM-1A