

第2類医薬品

漢方製剤



じんりょうびやくじゅつさんりょう

参苓白朮散料エキス細粒G「コタロー」

商品番号

D062

服用に際しては、この説明文書を必ずお読みください。
また必要な時に読めるように大切に保管してください。

体が疲れやすくて、食欲がない。食後胃のあたりがはつてきたり、食べ過ぎたり油ものを食べると下痢をする。もう少し太りたいのに、太れない。このような症状は、胃腸虚弱で、消化や吸収がうまく行われていないために起こります。下痢をしたり、栄養を吸収できないと、せっかく食べた美味しいものも身に付かず、太れなかったり、体が疲れやすくなったりします。

参苓白朮散料エキス細粒G「コタロー」は、疲れやすく、やせて顔色も悪い方の胃腸の動きを調節して、下痢や食欲不振を改善する薬です。



使用上の注意



してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなります)

次の人は服用しないでください

生後3ヵ月未満の乳児。



相談すること

1. 次の人は服用前に医師または薬剤師に相談してください

- (1) 医師の治療を受けている人。
- (2) 妊婦または妊娠していると思われる人。
- (3) 高齢者。
- (4) 次の症状のある人。
むくみ
- (5) 次の診断を受けた人。
高血圧、心臓病、腎臓病

2. 次の場合は、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師または薬剤師に相談してください

(1) まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症 状
偽アルドステロン症	尿量が減少する、顔や手足がむくむ、まぶたが重くなる、手がこわばる、血圧が高くなる、頭痛等があらわれる。

(2) 1ヵ月位服用しても症状がよくなる場合

3. 長期連用する場合には、医師または薬剤師に相談してください

【効能・効果】

やせて顔色が悪く、食欲がなく下痢が続く傾向があるものの次の諸症：
食欲不振、慢性下痢、病後の体力低下、疲労倦怠

【用法・用量】

食前または食間に服用してください。
食間とは……食後2～3時間を指します。

年 齢	1回量	1日服用回数
大人（15歳以上）	1包	3回
15歳未満7歳以上	2/3包	
7歳未満4歳以上	1/2包	
4歳未満2歳以上	1/3包	
2歳未満	1/4包	

＜用法・用量に関連する注意＞

- (1) 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。
- (2) 1歳未満の乳児には、医師の診療を受けさせることを優先し、止むを得ない場合にのみ服用させてください。

【成分・分量】


成分・分量 本剤3包(6.0g)中		
ニンジン……………2.40g	ヨクイニン……………4.00g	シュクシャ……………1.60g
サンヤク……………2.40g	ビャクヘンズ……………1.60g	カンゾウ……………1.20g
ビャクシュツ……………3.20g	レンニク……………1.60g	
フクリョウ……………3.20g	キキョウ……………1.60g	

より抽出した水製エキス3.90gを含有しています。

添加物として含水二酸化ケイ素、ステアリン酸マグネシウム、トウモロコシデンプンを含有しています。

【保管及び取扱い上の注意】

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。
(誤用の原因になったり品質が変わることがあります)
- (4) 水分が付きますと、品質の劣化をまねきますので、誤って水滴を落したり、ぬれた手で触れないでください。
- (5) 1包を分割した残りを服用する場合には、袋の口を折り返して保管し、2日以内に服用してください。
- (6) 使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。



【包装】

2.0g × 90包 (30日分)

本剤は生薬を原料としていますので、製品により多少色が異なることがありますが、品質・効果に変わりはありません。

製品内容についてのお問い合わせは、お買い求めのお店、または下記にお願い申し上げます。
小太郎漢方製薬株式会社 医薬事業部 お客様相談室
大阪市北区中津2丁目5番23号 TEL06 (6371) 9106
受付時間 9:00～17:30 (土、日、祝日を除く)

製造販売元 漢方をよりよく より多くの人に
小太郎漢方製薬株式会社
〒531-0071 大阪市北区中津2丁目5番23号
TEL 06 (6371) 9106

AH-1A