

第2類医薬品

漢方製剤



とうきぎやくかごしゅゆしほきょうとう

当帰四逆加呉茱萸生姜湯 エキス細粒G「コタロー」

商品番号

D199

服用に際しては、この説明文書を必ずお読みください。
また必要な時に読めるように大切に保管してください。

本剤は、しもやけを初め、冷えから来る頭痛、腰痛、下腹の痛みなどに用いられます。手足や下半身が冷えるが、現代医学では必ずしも病気として扱われません。冷え症の原因は職場や家の環境、冷房、衣服など原因もいろいろです。いずれにしても毎年しもやけに悩まされたり、持病のような頭痛などの原因ともなると軽くみることはできません。冷え症は漢方の得意とする分野とされますが、**当帰四逆加呉茱萸生姜湯エキス細粒G「コタロー」**は、体の内からこれらの症状を改善するお薬です。



使用上の注意



相談すること

1. 次の人は服用前に医師または薬剤師に相談してください

- (1) 医師の治療を受けている人。
- (2) 妊婦または妊娠していると思われる人。
- (3) 胃腸の弱い人。
- (4) 高齢者。
- (5) 今までに薬により発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。
- (6) 次の症状のある人。
むくみ
- (7) 次の診断を受けた人。
高血圧、心臓病、腎臓病

2. 次の場合は、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師または薬剤師に相談してください

- (1) 服用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症 状
偽アルドステロン症	尿量が減少する、顔や手足がむくむ、まぶたが重くなる、手がこわばる、血圧が高くなる、頭痛等があらわれる。

- (2) 1ヵ月位服用しても症状がよくならない場合

3. 長期連用する場合には、医師または薬剤師に相談してください

【効能・効果】

手足の冷えを感じ、下肢が冷えると下肢又は下腹部が痛くなり易いものの次の諸症：
しもやけ、頭痛、下腹部痛、腰痛

【用法・用量】

食前または食間に服用してください。
食間とは……食後2～3時間を指します。

年 齢	1回量	1日服用回数
大人（15歳以上）	1包	3回
15歳未満 7歳以上	2/3包	
7歳未満 4歳以上	1/2包	
4歳未満	服用しないでください	

＜用法・用量に関連する注意＞

小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。


【成分・分量】

成分・分量 本剤3包(7.2g)中			
トウキ……………	2.4g	モクツウ……………	2.4g
タイソウ……………	4.0g	ケイヒ……………	2.4g
サイシン……………	1.6g	ゴシュユ……………	1.6g
ジャクヤク……………	2.4g	カンソウ……………	1.6g
ショウキョウ……………	0.8g	より抽出した水製エキス4.8gを含有しています。	

添加物としてステアリン酸マグネシウム、トウモロコシデンプン、乳糖水和物、プルラン、メタケイ酸アルミン酸マグネシウムを含有しています。

【保管及び取扱い上の注意】

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。
(誤用の原因になったり品質が変わることがあります)
- (4) 水分が付きますと、品質の劣化をまねきますので、誤って水滴を落したり、ぬれた手で触れないでください。
- (5) 1包を分割した残りを服用する場合には、袋の口を折り返して保管し、2日以内に服用してください。
- (6) 使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。



本剤は生薬を原料としていますので、製品により多少色が異なることがありますが、品質・効果に変わりはありません。

製品内容についてのお問い合わせは、お買い求めのお店、または下記にお願い申し上げます。
小太郎漢方製薬株式会社 医薬事業部 お客様相談室
大阪市北区中津2丁目5番23号 TEL06 (6371) 9106
受付時間 9:00～17:30 (土、日、祝日を除く)

製造販売元 漢方をよりよく より多くの人に



小太郎漢方製薬株式会社

〒531-0071 大阪市北区中津2丁目5番23号
TEL 06 (6371) 9106

AM-1A