

第2類医薬品

漢方製剤



けい し ぶくりょう がんりょう

桂枝茯苓丸料エキス細粒G「コタロー」

商品番号

D090

服用に際しては、この説明文書を必ずお読みください。
また必要な時に読めるように大切に保管してください。

本剤は、のぼせやすく、足は逆に冷えるといった体質傾向(漢方という
瘀血)の方に用いる処方です。

桂枝茯苓丸料エキス細粒G「コタロー」は、体力はかなりあるのに、生
理が不順であり、またつらい方、打撲すると内出血を起こす方、のぼせ
て足が冷え、肩こり、頭痛を訴える方に効果があります。



使用上の注意



相談すること

1. 次の人は服用前に医師または薬剤師に相談してください

- (1)医師の治療を受けている人。
- (2)妊婦または妊娠していると思われる人。
- (3)体の虚弱な人(体力の衰えている人、体の弱い人)。
- (4)今までに薬により発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。

2. 次の場合は、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師または薬剤師に相談してください

- (1)服用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	食欲不振

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに
医師の診療を受けてください。

症状の名称	症状
肝機能障害	全身のだるさ、黄疸(皮膚や白目が黄色くなる) 等があらわれる。

- (2)1ヵ月位服用しても症状がよくなる場合

3. 次の症状があらわれることがありますので、このような症状の継続ま たは増強が見られた場合には、服用を中止し、医師または薬剤師に相 談してください

下痢

【効能・効果】

比較的体力があり、ときに下腹部痛、肩こり、頭重、めまい、のぼせて足
冷えなどを訴える次の諸症：
月経不順、月経異常、月経痛、更年期障害、血の道症、肩こり、めまい、頭
重、打ち身(打撲症)、しもやけ、しみ
※ 血の道症とは、月経、妊娠、出産、産後、更年期など女性のホルモンの
変動に伴って現れる精神不安やいらだちなどの精神神経症状および身体症
状のことである。

【用法・用量】

食前または食間に服用してください。
食間とは……食後2～3時間を指します。

年 齢	1回量	1日服用回数
大人（15歳以上）	1包	3回
15歳未満 7歳以上	2/3包	
7歳未満 4歳以上	1/2包	
4歳未満	服用しないでください	

＜用法・用量に関連する注意＞

小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてくだ
さい。


【成分・分量】

成分・分量 本剤3包(4.8g)中		
ケイヒ……………3.20g	ボタンビ……………3.20g	シャクヤク……………3.20g
フクリョウ……………3.20g	トウニン……………3.20g	
より抽出した桂枝茯苓丸エキス(4/5量)2.24gを含有しています。		

添加物としてステアリン酸マグネシウム、トウモロコシデンプン、乳糖水和物、プルラン、メタケイ酸
アルミン酸マグネシウムを含有しています。

【保管及び取扱い上の注意】

- (1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してくだ
さい。
- (2)小児の手の届かない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れ替えないでください。
(誤用の原因になったり品質が変わることがあります)
- (4)水分が付きますと、品質の劣化をまねきますので、誤って水
滴を落したり、ぬれた手で触れないでください。
- (5)1包を分割した残りを服用する場合には、袋の口を折り返し
て保管し、2日以内に服用してください。
- (6)使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。



【包装】

1.6g × 90包(30日分)

本剤は生薬を原料としていますので、製品により多少色が異なることがあります。品質・
効果に変わりはありません。

製品内容についてのお問い合わせは、お買い求めのお店、または下記にお願い申し上げます。
小太郎漢方製薬株式会社 医薬事業部 お客様相談室
大阪市北区中津2丁目5番23号 TEL06(6371)9106
受付時間 9:00～17:30(土、日、祝日を除く)