



漢方製剤

じ いんこう かとう

滋陰降火湯 エキス細粒G「コタロー」

商品番号
D056服用に際しては、この説明文書を必ずお読みください。
また必要な時に読めるように大切に保管してください。

ノドが乾いて咳が出て、痰に粘り気が強くて切れにくい。これは、ノドや呼吸器が炎症で熱を持ち、潤いが足りなくなった状態です。健康な人の体では、熱とこれを冷ます水分がうまくバランスを保っています。しかし、風邪などにより呼吸器の炎症が起きると、水分が消耗してからからの状態となり、熱が際立ってしまいます。

滋陰降火湯エキス細粒G「コタロー」は、このような場合の熱をとり、潤いを持たせることによって、熱と水分を適切なバランスにし、切れにくい痰や咳を改善する薬です。



使用上の注意



してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなります)

次の人は服用しないでください

生後3ヵ月未満の乳児。



相談すること

1. 次の人は服用前に医師または薬剤師に相談してください

- (1) 医師の治療を受けている人。
- (2) 妊婦または妊娠していると思われる人。
- (3) 胃腸の弱い人。
- (4) 高齢者。
- (5) 今までに薬により発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。
- (6) 次の症状のある人。
むくみ
- (7) 次の診断を受けた人。
高血圧、心臓病、腎臓病

2. 次の場合は、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師または薬剤師に相談してください

(1) 服用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	胃部不快感

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症 状
偽アルドステロン症	尿量が減少する、顔や手足がむくむ、まぶたが重くなる、手がこわばる、血圧が高くなる、頭痛等があらわれる。

(2) 1ヵ月位服用しても症状がよくならない場合

3. 長期連用する場合には、医師または薬剤師に相談してください

4. 次の症状があらわれることがありますので、このような症状の継続または増強が見られた場合には、服用を中止し、医師または薬剤師に相談してください

下痢

*【効能・効果】

体力虚弱で、のどにうるおいがなく、たんが切れにくくてせきこみ、皮膚が浅黒く乾燥し、便秘傾向のあるものの次の諸症：
気管支炎、せき

【用法・用量】

食前または食間に服用してください。
食間とは……食後2～3時間を指します。

年 齢	1回量	1日服用回数
大人（15歳以上）	1包	3回
15歳未満7歳以上	2/3包	
7歳未満4歳以上	1/2包	
4歳未満2歳以上	1/3包	
2歳未満	1/4包	

＜用法・用量に関連する注意＞

- (1) 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。
- (2) 1歳未満の乳児には、医師の診療を受けさせることを優先し、止むを得ない場合にのみ服用させてください。


【成分・分量】

成分・分量 本剤3包(9.0g)中		
オウバク……………1.2g	チモ……………1.2g	ビャクジュツ……………2.4g
カンゾウ……………1.2g	チンピ……………2.0g	テンモンドウ……………2.0g
ジオウ……………2.0g	トウキ……………2.0g	
ジャクヤク……………2.0g	バクモンドウ……………2.0g	
より抽出した水製エキス6.7gを含有しています。		

添加物として含水二酸化ケイ素、ステアリン酸マグネシウム、トモロコシデンプンを含有しています。

【保管及び取扱い上の注意】

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。
(誤用の原因になったり品質が変わることがあります)
- (4) 水分が付きますと、品質の劣化をまねきますので、誤って水滴を落したり、ぬれた手で触れないでください。
- (5) 1包を分割した残りを服用する場合には、袋の口を折り返して保管し、2日以内に服用してください。
- (6) 使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。



本剤は生薬を原料としていますので、製品により多少色が異なることがありますが、品質・効果に変わりはありません。

製品内容についてのお問い合わせは、お買い求めのお店、または下記にお願い申し上げます。
小太郎漢方製薬株式会社 医薬事業部 お客様相談室
大阪市北区中津2丁目5番23号 TEL06 (6371) 9106
受付時間 9:00～17:30 (土、日、祝日を除く)