



漢方製剤

ほちゅうえっ き と う

補中益気湯 エキス細粒G「コタロー」

商品番号

D048

本剤は、疲れやすく、食欲がないといった方に用いられる処方です。

補中益気湯エキス細粒G「コタロー」は、疲れがたまって、手足がぬけるようにだるいという方、普段胃腸があまり丈夫でない方、あるいは太れないタイプの方、病後でまだ本調子でない方を目安に用いられます。



## 使用上の注意



## してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなります)

次の人は服用しないでください

生後3ヵ月未満の乳児。



## 相談すること

## 1. 次の人は服用前に医師または薬剤師に相談してください

- (1) 医師の治療を受けている人。
- (2) 妊婦または妊娠していると思われる人。
- (3) 高齢者。
- (4) 今までに薬により発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。
- (5) 次の症状のある人。  
むくみ
- (6) 次の診断を受けた人。  
高血圧、心臓病、腎臓病

## 2. 次の場合は、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師または薬剤師に相談してください

(1) 服用後、次の症状があらわれた場合

| 関係部位 | 症 状       |
|------|-----------|
| 皮 膚  | 発疹・発赤、かゆみ |

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

| 症状の名称     | 症 状                                                 |
|-----------|-----------------------------------------------------|
| 間質性肺炎     | せきを伴い、息切れ、呼吸困難、発熱等があらわれる。                           |
| 偽アルドステロン症 | 尿量が減少する、顔や手足がむくむ、まぶたが重くなる、手がこわばる、血圧が高くなる、頭痛等があらわれる。 |
| 肝機能障害     | 全身のだるさ、黄疸(皮膚や白目が黄色くなる)等があらわれる。                      |

(2) 1ヵ月位(感冒に服用する場合には5～6日間)服用しても症状がよくならない場合

## 3. 長期連用する場合には、医師または薬剤師に相談してください

## \*【効能・効果】

体力虚弱で、元気がなく、胃腸のはたらきが衰えて、疲れやすいものの次の諸症：  
虚弱体質、疲労倦怠、病後・術後の衰弱、食欲不振、ねあせ、感冒

## 【用法・用量】

食前または食間に服用してください。  
食間とは……食後2～3時間を指します。

| 年 齢       | 1回量  | 1日服用回数 |
|-----------|------|--------|
| 大人(15歳以上) | 1包   | 3回     |
| 15歳未満7歳以上 | 2/3包 |        |
| 7歳未満4歳以上  | 1/2包 |        |
| 4歳未満2歳以上  | 1/3包 |        |
| 2歳未満      | 1/4包 |        |

## ＜用法・用量に関連する注意＞

- (1) 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。
- (2) 1歳未満の乳児には、医師の診療を受けさせることを優先し、止むを得ない場合にのみ服用させてください。

## 【成分・分量】

成分・分量 本剤3包(9.6g)中

|                 |               |                 |
|-----------------|---------------|-----------------|
| ニンジン……………3.2g   | チンピ……………1.6g  | カンゾウ……………1.2g   |
| ビャクジュツ……………3.2g | タイソウ……………1.6g | ショウマ……………0.8g   |
| オウギ……………3.2g    | サイコ……………1.6g  | ショウキョウ……………0.4g |
| トウキ……………2.4g    |               |                 |

より抽出した補中益気湯エキス(4/5量)5.6gを含有しています。

添加物としてステアリン酸マグネシウム、トウモロコシデンプン、乳糖水和物、プルラン、メタケイ酸アルミン酸マグネシウムを含有しています。

## 【保管及び取扱い上の注意】

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。  
(誤用の原因になったり品質が変わることがあります)
- (4) 水分が付きますと、品質の劣化をまねきますので、誤って水滴を落したり、ぬれた手で触れないでください。
- (5) 1包を分割した残りを服用する場合には、袋の口を折り返して保管し、2日以内に服用してください。
- (6) 使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。



本剤は生薬を原料としていますので、製品により多少色が異なることがあります。品質・効果に変わりはありません。

製品内容についてのお問い合わせは、お買い求めのお店、または下記にお願い申し上げます。  
小太郎漢方製薬株式会社 医薬事業部 お客様相談室  
大阪市北区中津2丁目5番23号 TEL06 (6371) 9106  
受付時間 9:00～17:30(土、日、祝日を除く)

製造販売元 漢方をよりよく より多くの人に



小太郎漢方製薬株式会社

〒531-0071 大阪市北区中津2丁目5番23号  
TEL 06 (6371) 9106

AF-1B