

服用に際しては、この説明文書を必ずお読みください。  
また必要な時に読めるように大切に保管してください。

第2類医薬品

ひきははじめのかぜに  
さむけ、発熱、頭痛、肩こり

商品番号

A069

漢方製剤

満量処方

葛根湯

カ ッ コ ン ト ウ

エキス細粒V

エキス細粒V「コタロー」

◇かぜはひきははじめが肝心で、この時期に十分な静養をとるなどして治すことが大切です。

葛根湯エキス細粒V「コタロー」は、かぜの初期に用いられる漢方薬で、鼻がグズグズしてかぜをひいたかなというときにぞくぞくとする寒けや頭痛があり、熱はあるが汗はでていないといったときに効果があります。

◇肩こりや筋肉痛にも用いられます。



### 使用上の注意



#### してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)

次の人は服用しないでください

生後3ヵ月未満の乳児。



#### 相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

- (1)医師の治療を受けている人。
- (2)妊婦又は妊娠していると思われる人。
- (3)体の虚弱な人（体力の衰えている人、体の弱い人）。
- (4)胃腸の弱い人。
- (5)発汗傾向の著しい人。
- (6)高齢者。
- (7)今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。
- (8)次の症状のある人。  
むくみ、排尿困難
- (9)次の診断を受けた人。  
高血圧、心臓病、腎臓病、甲状腺機能障害

2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性がありますので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

| 関係部位 | 症 状            |
|------|----------------|
| 皮 膚  | 発疹・発赤、かゆみ      |
| 消化器  | 吐き気、食欲不振、胃部不快感 |

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

| 症状の名称               | 症 状                                                     |
|---------------------|---------------------------------------------------------|
| 偽アルドステロン症、<br>ミオパチー | 手足のだるさ、しびれ、つっぱり感やこわばりに加えて、脱力感、筋肉痛があらわれ、徐々に強くなる。         |
| 肝機能障害               | 発熱、かゆみ、発疹、黄疸（皮膚や白目が黄色くなる）、褐色尿、全身のだるさ、食欲不振等があらわれる。       |
| 多形紅斑*               | 皮膚が広い範囲で赤くなる、水疱が皮膚の赤い部分にあらわれる、高熱、のどの痛み等が持続したり、急激に悪化する。* |

3. 1ヵ月位（感冒の初期、鼻かぜ、頭痛に服用する場合には5～6回）服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
4. 長期連用する場合には、医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

## 【効能・効果】

感冒、鼻かぜ、頭痛、肩こり、筋肉痛、手や肩の痛み

## 【用法・用量】

食前又は食間に服用してください。

食間とは……食後2～3時間を指します。

| 年 齢       | 1回量  | 1日服用回数 |
|-----------|------|--------|
| 大人（15歳以上） | 1包   | 3回     |
| 15歳未満7歳以上 | 2／3包 |        |
| 7歳未満4歳以上  | 1／2包 |        |
| 4歳未満2歳以上  | 1／3包 |        |
| 2歳未満      | 1／4包 |        |

## ＜用法・用量に関連する注意＞

- (1)小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。
- (2)1歳未満の乳児には、医師の診療を受けさせることを優先し、やむを得ない場合にのみ服用させてください。


## 【成分・分量】

| 成分・分量（本剤3包中）              |      |        |      |
|---------------------------|------|--------|------|
| カッコン                      | 8.0g | シャクヤク  | 3.0g |
| マオウ                       | 4.0g | カンゾウ   | 2.0g |
| タイソウ                      | 4.0g | ショウキョウ | 1.0g |
| ケイヒ                       | 3.0g |        |      |
| より抽出した葛根湯エキス5.0gを含有しています。 |      |        |      |

添加物として含水二酸化ケイ素、ステアリン酸マグネシウムを含有しています。

## 【保管及び取扱い上の注意】

- (1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2)小児の手の届かない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れ替えないでください。  
（誤用の原因になったり品質が変わることがあります）
- (4)水分が付きますと、品質の劣化をまねきますので、誤って水滴を落したり、ぬれた手で触れないでください。
- (5)1包を分割した残りを服用する場合には、袋の口を折り返して保管し、2日以内に服用してください。
- (6)使用期限を過ぎた商品は服用しないでください。



本剤は生薬を原料としていますので、商品により多少色が異なることがありますが、品質・効果に変わりはありません。

商品内容についてのお問い合わせは、お買い求めのお店、又は下記にお願い申し上げます。  
小太郎漢方製薬株式会社 医薬事業部 お客様相談室  
大阪市北区中津2丁目5番23号 TEL06(6371)9106  
受付時間 9:00～17:30(土、日、祝日を除く)

副作用被害救済制度のお問い合わせ先  
(独)医薬品医療機器総合機構  
<https://www.pmda.go.jp/>  
☎フリーダイヤル0120(149)931



製造販売元 漢方をよりよく より多くの人に  
**小太郎漢方製薬株式会社**  
〒531-0071 大阪市北区中津2丁目5番23号  
TEL 06 (6371) 9106