

第2類医薬品



漢方製剤

いんちん ご れいさん

茵陳五苓散 エキス細粒G「コタロー」

商品番号

D052

服用に際しては、この説明文書を必ずお読みください。
また必要な時に読めるように大切に保管してください。

口が渇き、尿量が減り、吐いたり、むくんだりする時によく用いられる漢方薬です。五苓散（いんちん ご れいさん）（カワラヨモギの花穂）を加えた処方であることから、五苓散（口渇と尿量減少）の病態に肝胆の炎症（熱）を伴ったものによいといわれています。

茵陳五苓散エキス細粒G「コタロー」は、お酒の飲み過ぎによる二日酔、むくみのほか、皮膚にあらわれるじん麻疹などにも用いられます。



使用上の注意



してはいけないこと

（守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなります）

次の人は服用しないでください

生後3ヵ月未満の乳児。



相談すること

1. 次の人は服用前に医師または薬剤師に相談してください

- (1) 医師の治療を受けている人。
- (2) 妊婦または妊娠していると思われる人。
- (3) 今までに薬により発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。

2. 次の場合は、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師または薬剤師に相談してください

(1) 服用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ

(2) 1ヵ月位（嘔吐、二日酔に服用する場合には5～6回）服用しても症状がよくなる場合

【効能・効果】

体力中等度以上をめやすとして、のどが渇いて、尿量が少ないものの次の諸症：

じんましん、二日酔、むくみ、嘔吐

【用法・用量】

食前または食間に服用してください。

食間とは……食後2～3時間を指します。

年 齢	1回量	1日服用回数
大人（15歳以上）	1包	3回
15歳未満7歳以上	2/3包	
7歳未満4歳以上	1/2包	
4歳未満2歳以上	1/3包	
2歳未満	1/4包	

＜用法・用量に関連する注意＞

- (1) 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。
- (2) 1歳未満の乳児には、医師の診療を受けさせることを優先し、止むを得ない場合にのみ服用させてください。

【成分・分量】

成分・分量 本剤3包（4.5g）中

タクシャ……………4.8g	ブクリョウ……………3.6g	チョレイ……………3.6g
ビャクジョツ……………3.6g	ケイヒ……………2.4g	インチンコウ……………3.2g

より抽出した水製エキス3.40gを含有しています。

添加物として含水二酸化ケイ素、ステアリン酸マグネシウム、トウモロコシデンプンを含有しています。

【保管及び取扱い上の注意】

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。
（誤用の原因になったり品質が変わることがあります）
- (4) 水分が付きまると、品質の劣化をまねきますので、誤って水滴を落したり、ぬれた手で触れないでください。
- (5) 1包を分割した残りを服用する場合には、袋の口を折り返して保管し、2日以内に服用してください。
- (6) 使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。



湿気注意

本剤は生薬を原料としていますので、製品により多少色が異なることがあります。品質・効果に変わりはありません。

製品内容についてのお問い合わせは、お買い求めのお店、または下記にお願い申し上げます。
小太郎漢方製薬株式会社 医薬事業部 お客様相談室
大阪市北区中津2丁目5番23号 TEL06（6371）9106
受付時間 9：00～17：30（土、日、祝日を除く）

製造販売元 漢方をよりよく より多くの人に



小太郎漢方製薬株式会社

〒531-0071 大阪市北区中津2丁目5番23号
TEL 06（6371）9106

AP-1