

二日酔 むかつきに

販売名 茵陳五苓散エキス細粒G「コタロー」

商品番号

Q052

口が渇き、尿量が減り、吐いたり、むくんだりする。そのような時に応用されるのがこのお薬です。

お酒の飲み過ぎによる二日酔、むかつき、むくみのほか、皮膚にあらわれるじんましんにも効果があります。



使用上の注意



してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)

次の人は服用しないでください

生後3ヵ月未満の乳児。



相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師または登録販売者に相談してください

(1)医師の治療を受けている人。

(2)妊婦または妊娠していると思われる人。

(3)今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。

2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師または登録販売者に相談してください

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ

3. 1ヵ月位（嘔吐、二日酔に服用する場合には5～6回）服用しても症状がよくなりえない場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師または登録販売者に相談してください

【効能・効果】

体力中等度以上をめやすとして、のどが渇いて、尿量が少ないものの次の諸症：
二日酔、嘔吐、むくみ、じんましん

【用法・用量】

食前または食間に服用してください。
食間とは……食後2～3時間を指します。

年 齢	1 回 量	1 日服用回数
大人（15歳以上）	1 包	3 回
15歳未満7歳以上	2/3包	
7歳未満4歳以上	1/2包	
4歳未満2歳以上	1/3包	
2歳未満	1/4包	

〈用法・用量に関連する注意〉

- (1)小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。
- (2)1歳未満の乳児には、医師の診療を受けさせることを優先し、止むを得ない場合にのみ服用させてください。

【成分・分量】

成分・分量 本剤3包（4.5g）中			
タクシャ……………	4.8g	チョレイ……………	3.6g
ブクリョウ……………	3.6g	ビャクジュツ……………	3.6g
より抽出した水製エキス3.40gを含有しています。			

添加物として含水二酸化ケイ素、ステアリン酸マグネシウム、トウモロコシデンプンを含有しています。

【保管及び取扱い上の注意】

- (1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2)小児の手の届かない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れ替えないでください。
（誤用の原因になったり品質が変わることがあります）
- (4)水分が付きますと、品質の劣化をまねきますので、誤って水滴を落したり、ぬれた手で触れないでください。
- (5)1包を分割した残りを服用する場合には、袋の口を折り返して保管し、2日以内に服用してください。
- (6)使用期限を過ぎた商品は服用しないでください。
- (7)箱の「開封年月日」記入欄に、箱を開封した日付を記入してください。



本剤は生薬を原料としていますので、商品により多少色が異なることがあります。品質・効果に変わりはありません。

商品内容についてのお問い合わせは、お買い求めのお店、または下記にお願い申し上げます。
小太郎漢方製薬株式会社 医薬事業部 お客様相談室
大阪市北区中津2丁目5番23号 TEL06(6371)9106
受付時間 9:00～17:30(土、日、祝日を除く)

副作用被害救済制度のお問い合わせ先
(独)医薬品医療機器総合機構
<http://www.pmda.go.jp/>
フリーダイヤル0120(149)931

製造販売元 小太郎漢方製薬株式会社
〒531-0071 大阪市北区中津2丁目5番23号