

第2類医薬品



漢方製剤

服用に際しては、この説明文書を必ずお読みください。
また必要な時に読めるように大切に保管してください。

けいぼうはいどくさん

荊防敗毒散 エキス細粒G「コタロー」

商品番号

D084

この処方名には「荊芥・防風を主薬とした化膿などの毒を敗退（しりぞく）させる散剤」という意味があります。発表薬（発汗薬）が主薬になっていることから、病邪が皮膚表面にとどまっている状態（主に初期の皮膚化膿症）によりと考えられています。

荊防敗毒散エキス細粒G「コタロー」は、湿疹や皮膚炎などの化膿症の初期で、発赤（赤い）、腫脹（はれる）、疼痛（痛い）など炎症症状が顕著なものを改善させる漢方薬です。



使用上の注意



してはいけないこと

（守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなります）
次の人は服用しないでください
生後3ヵ月未満の乳児。



相談すること

1. 次の人は服用前に医師または薬剤師に相談してください

- (1) 医師の治療を受けている人。
- (2) 妊婦または妊娠していると思われる人。
- (3) 胃腸が弱く下痢しやすい人。
- (4) 今までに薬により発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。

2. 次の場合は、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師または薬剤師に相談してください

- (1) 服用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	食欲不振、胃部不快感

- (2) 1週間間服用しても症状がよくなるらない場合

3. 本剤の服用により、まれに症状が進行することもありますので、このような場合には、服用を中止し、医師または薬剤師に相談してください

【効能・効果】

比較体力があるものの次の諸症：
急性化膿性皮膚疾患の初期、湿疹・皮膚炎

【用法・用量】

食前または食間に服用してください。
食間とは……食後2～3時間を指します。

年齢	1回量	1日服用回数
大人（15歳以上）	1包	3回
15歳未満7歳以上	2/3包	
7歳未満4歳以上	1/2包	
4歳未満2歳以上	1/3包	
2歳未満	1/4包	

＜用法・用量に関連する注意＞

- (1) 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。
- (2) 1歳未満の乳児には、医師の診療を受けさせることを優先し、止むを得ない場合にのみ服用させてください。

【成分・分量】

成分・分量 本剤3包(6.0g)中			
ケイガイ……………1.6g	ボウフウ……………1.6g	キョウカツ……………1.6g	ハッカ……………1.6g
ドクカツ……………1.6g	サイコ……………1.6g	キコク……………1.6g	キンギンカ……………1.6g
レンギョウ……………1.6g	キキョウ……………1.6g		
センキュウ……………1.6g	ゼンコ……………1.6g		
カンソウ……………0.8g	ブクリョウ……………1.6g		

より抽出した水製エキス4.80gを含有しています。

添加物として含水二酸化ケイ素、ステアリン酸マグネシウムを含有しています。

【保管及び取扱い上の注意】

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。
（誤用の原因になったり品質が変わることがあります）
- (4) 水分が付きますと、品質の劣化をまねきますので、誤って水滴を落したり、ぬれた手で触れないでください。
- (5) 1包を分割した残りを服用する場合には、袋の口を折り返し保管し、2日以内に服用してください。
- (6) 使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。



湿気注意

本剤は生薬を原料としていますので、製品により多少色が異なることがありますが、品質・効果に変わりはありません。

製品内容についてのお問い合わせは、お買い求めのお店、または下記にお願い申し上げます。

小太郎漢方製薬株式会社 医薬事業部 お客様相談室
大阪市北区中津2丁目5番23号 TEL06 (6371) 9106
受付時間 9:00～17:30（土、日、祝日を除く）

製造販売元 漢方をよりよく より多くの人に
小太郎漢方製薬株式会社
〒531-0071 大阪市北区中津2丁目5番23号
TEL 06 (6371) 9106
AP-1