

第2類医薬品

漢方製剤



中国の民間説話「白蛇伝」に登場する女性を伝統的な漢方のイメージとしてシンボルマークとしたものです。

服用に際しては、この説明文書を必ずお読みください。  
また必要な時に読めるように大切に保管してください。

きゅう き ちょう けつ いん だい いち か げん  
**芎帰調血飲第一加減**  
エキス細粒G「コタロー」

商品番号

D118

出産後や生理の際などで、体調が充分でなく、貧血ぎみで、手足に冷えを感じたり、気がふさいで頭痛、めまいがし、食欲もないといった訴えのある場合があります。

これらは自律神経や内分泌系のバランスとも関係があるとされていますが、**芎帰調血飲第一加減エキス細粒G「コタロー」**は気のめぐりをよくし、血行を改善することによって、産後や更年期などの体調を整える漢方薬です。



**使用上の注意**



**相談すること**

- 次の人は服用前に医師または薬剤師に相談してください
  - 医師の治療を受けている人。
  - 妊婦または妊娠していると思われる人。
  - 胃腸が弱く下痢しやすい人。
  - 今までに薬により発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。
- 次の場合は、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師または薬剤師に相談してください
  - 服用後、次の症状があらわれた場合

| 関係部位 | 症 状           |
|------|---------------|
| 皮 膚  | 発疹・発赤、かゆみ     |
| 消化器  | 悪心、食欲不振、胃部不快感 |

- 1ヵ月位服用しても症状がよくなる場合

**【効能・効果】**

体力中等度以下のものの次の諸症。ただし産後の場合は体力に関わらず使用できる。:

月経不順、産後の体力低下、血の道症

**〈効能・効果に関連する注意〉**

血の道症とは、月経、妊娠、出産、産後、更年期など女性のホルモンの変動に伴って現れる精神不安やいらだちなどの精神神経症状および身体症状のことである。

【用法・用量】

食前または食間に服用してください。  
食間とは……食後2～3時間を指します。

| 年 齢       | 1回量            | 1日服用回数 |
|-----------|----------------|--------|
| 大人（15歳以上） | 1包 または 2.5g    | 3回     |
| 15歳未満7歳以上 | 2/3包 または 1.67g |        |
| 7歳未満4歳以上  | 1/2包 または 1.25g |        |
| 4歳未満      | 服用しないでください     |        |

（大入り剤に添付のサジは、大が1.0g、小が0.1gの計量用となっております）

〈用法・用量に関連する注意〉

小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。

【成分・分量】

| 成分・分量 本剤3包（7.5g）中        |                |                |  |
|--------------------------|----------------|----------------|--|
| トウキ……………2.0g             | コウブシ……………2.0g  | トウニン……………1.2g  |  |
| センキュウ……………2.0g           | ボタンピ……………2.0g  | コウカ……………1.2g   |  |
| ジオウ……………1.2g             | ヤクモソウ……………0.8g | キジツ……………1.2g   |  |
| ビャクジュツ……………2.0g          | タイソウ……………0.8g  | ケイヒ……………1.2g   |  |
| ブクリョウ……………2.0g           | カンゾウ……………0.8g  | ゴシツ……………1.2g   |  |
| チンピ……………2.0g             | カンキョウ……………0.8g | モッコウ……………1.2g  |  |
| ウヤク……………2.0g             | シャクヤク……………1.2g | エンゴサク……………1.2g |  |
| より抽出した水製エキス6.2gを含有しています。 |                |                |  |

添加物として含水二酸化ケイ素、ステアリン酸マグネシウムを含有しています。

【保管及び取扱い上の注意】

- (1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2)小児の手の届かない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れ替えないでください。  
（誤用の原因になったり品質が変わることがあります）
- (4)水分が付きますと、品質の劣化をまねきますので、誤って水滴を落としたり、ぬれた手で触れないでください。
- (5)1包を分割した残りを服用する場合には、袋の口を折り返して保管し、2日以内に服用してください。  
（分包剤のみ）
- (6)湿気などにより薬が変質することがありますので、服用後は、ビンのフタをよくしめてください。  
（大入り剤のみ）
- (7)使用期限を過ぎた商品は服用しないでください。
- (8)ビンの「開封年月日」記入欄に、ビンを開封した日付を記入してください。  
（大入り剤のみ）



副作用被害救済制度の問い合わせ先、リサイクルに関する情報を外箱に記載しています。  
外箱のは、外箱の印刷に環境に配慮した大豆油インキを使用していることを表しています。

本剤は生薬を原料としていますので、商品により多少色が異なることがあります、品質・効果に変わりはありません。

商品内容についてのお問い合わせは、お買い求めのお店、または下記にお願い申し上げます。  
小太郎漢方製薬株式会社 医薬事業部 お客様相談室  
大阪市北区中津2丁目5番23号 TEL06(6371)9106  
受付時間 9:00～17:30(土、日、祝日を除く)

漢方薬ガイド  
請求券



D118 SC1

左のシールをハガキに貼って、お買求めの店名、住所、氏名、年齢、職業、電話番号、症状をお書き添えのうえ、お申込みください。漢方薬と食養を詳しく説明した、パンフレットをお送りいたします。



製造販売元 漢方をよりよく より多くの人に

小太郎漢方製薬株式会社

〒531-0071 大阪市北区中津2丁目5番23号  
TEL 06 (6371) 9106